

麻黄鱼腥草散

Mahuang Yuxingcao San

【处方】 麻黄 50g 黄芩 50g 鱼腥草 100g 穿心莲 50g
 板蓝根 50g

【制法】 以上5味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为黄绿色至灰绿色的粉末；气微，味微涩。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：气孔特异，保卫细胞侧面观呈哑铃状。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。叶表皮细胞多角形，有较密的波状纹理，有油细胞散在，类圆形，70~80 μm ，其周围有6~7个表皮细胞呈放射状排列。叶表皮组织中含钟乳体晶细胞。木纤维成束，淡黄色，多碎断，直径14~25 μm ，微木化，纹孔及孔沟较明显。

(2) 取本品6g，加浓氨试液2ml，三氯甲烷30ml，加热回流1小时，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，~~振摇~~滤过，滤液作为供试品溶液。另取~~盐酸麻黄碱对照药材1g~~，~~同法制成对照药材加甲醇制成每1ml含1mg的溶液~~，~~作为对照品溶液~~。照薄层色谱法(附录0502)试验，吸取上述~~两种供试品溶液各8 μl~~ ，~~对照品溶液5 μl~~ ，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-浓氨试液(20:5:0.5)为展开剂，~~预饱和30分钟~~，展开，取出，晾干，喷以茚三酮试液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与~~对照药材~~色谱相应的位置上，显相同的一个紫红色主斑点。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录0101)。

【功能】 宣肺泄热，平喘止咳。

【主治】 肺热咳喘，鸡支原体病。

【用法与用量】 混饲：每1kg饲料，鸡15~20g。

【贮藏】 密闭，防潮。