

禽多杀性巴氏杆菌病灭活疫苗（1502 株）

Qin Duoshaxingbashiganjunbing Miehuoyimiao（1502 Zhu）

Avian *Pasteurella multocida* Vaccine, Inactivated（Strain 1502）

本品系用禽多杀性巴氏杆菌 1502 株（CVCC 2802）接种适宜培养基培养，收获培养物，用甲醛溶液灭活后，加氢氧化铝胶浓缩，再与矿物油佐剂混合乳化制成。用于预防禽多杀性巴氏杆菌病（即禽霍乱）。

【性状】 外观 均匀乳剂。静置后，上层可有微量液体，下层可有少量沉淀。

剂型 为油包水型。取一清洁吸管，吸取少量疫苗滴于冷水表面，除第 1 滴外，均不应扩散。

稳定性 吸取疫苗 10 ml 加入离心管中，以 3000 r/min 离心 15 分钟，管底析出的水相应不超过 0.5 ml。

黏度 按附录 3102 进行检验，应符合规定。

【装量检查】 按附录 3104 进行检查，应符合规定。

【无菌检验】 按附录 3306 进行检验，应无菌生长。

【安全检验】 用 2~4 月龄 SPF 鸡 4 只，各颈部皮下注射疫苗 2.0 ml，观察 14 日，接种局部应无严重反应，且应全部健活。

【效力检验】 用 3~6 月龄 SPF 鸡 8 只，5 只各颈部皮下注射疫苗 1.0 ml，另 3 只作对照。21 日后，每只鸡各肌肉注射 1 MLD 的禽多杀性巴氏杆菌 C48-1 株（CVCC 44801）菌液，观察 14 日。对照鸡应全部死亡，免疫鸡应至少保护 3 只。

【甲醛和汞类防腐剂残留量测定】 分别按附录 3203 和 3202 进行测定，应符合规定。

【作用与用途】 用于预防禽多杀性巴氏杆菌病（即禽霍乱）。免疫期，鸡为 6 个月，鸭为 9 个月。

【用法与用量】 颈部皮下注射。2 月龄以上的鸡或鸭，每只 1.0 ml。

【注意事项】 （1）切忌冻结，冻结过的疫苗严禁使用。

（2）久置后，上层出现微量（不超过 1/10）的油析出。使用时应振摇均匀。

（3）接种时，应作局部消毒处理。

（4）接种后一般无明显反应，个别动物有 1~3 日减食。

（5）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

（6）屠宰前 28 日内禁止使用。

【规格】 （1）100 ml/瓶 （2）250 ml/瓶 （3）500 ml/瓶

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为 12 个月。