

鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）二联灭活疫苗（La Sota 株+F 株）

说明书

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称：鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）二联灭活疫苗（La Sota 株+F 株）

商品名称：

英文名称：Combined Newcastle Disease and Avian Influenza (Subtype H9) Vaccine, Inactivated (Strain La Sota+Strain F)

汉语拼音：Ji Xinchengyi, Qinliugan (H9 Yaxing) Erlian Miehuoyimiao (La Sota Zhu+F Zhu)

【主要成分】 本品含灭活的鸡新城疫病毒 La Sota 株和灭活的 A 型禽流感病毒 H9 亚型 A/Chicken/Shanghai/1/98 (H9N2) 株（简称 F 株）。

【性状】 均匀乳剂。

【作用与用途】 用于预防鸡新城疫和 H9 亚型禽流感病毒引起的禽流感。接种后 21 日产生免疫力。

【用法与用量】 肌肉或颈部皮下注射。无母源抗体或母源抗体（1 日龄鸡新城疫和 H9 亚型禽流感病毒母源抗体）不超过 1：32 的雏鸡，在 7~14 日龄时首免，每只 0.2 ml，免疫期为 2 个月；母源抗体高于 1：32 的雏鸡，在 2 周龄后首免，每只 0.5 ml，免疫期为 5 个月；母鸡在开产前 2~3 周接种，每只 0.5 ml，免疫期为 6 个月。

【注意事项】 （1）切忌冻结，冻结过的疫苗严禁使用。

（2）体质瘦弱、患有其他疾病的鸡，禁止使用。

（3）使用前，应仔细检查疫苗，如发现破乳、疫苗中混有异物等情况时，不能使用。

（4）使用时，应将疫苗恢复至室温，并充分摇匀。

（5）疫苗开启后，限当日用完。

（6）接种时，应作局部消毒处理。

（7）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

（8）接种本疫苗的种鸡所产子代具有较高的抗体水平，因此，应对子代的有关免疫程序进行适当调整。建议免疫期内的种鸡所产子代于 10~14 日龄时初次进行鸡新城疫疫苗接种。

（9）用于肉鸡时，屠宰前 21 日内禁止使用；用于其他鸡时，屠宰前 42 日内禁止使用。

【规格】 （1）100 ml/瓶 （2）250 ml/瓶 （3）300 ml/瓶 （4）500 ml/瓶

【贮藏与有效期】 2~8℃ 保存，有效期为 12 个月。

【包装】

【批准文号】

【生产企业】