

# 布鲁氏菌病活疫苗（S2 株）说明书

兽用非处方药

## 【兽药名称】

通用名称：布鲁氏菌病活疫苗（S2 株）

商品名称：

英文名称：Brucellosis Vaccine, Live (Strain S2)

汉语拼音：Bulushijunbing Huoyimiao (S2 Zhu)

**【主要成分与含量】** 本品含猪种布鲁氏菌 S2 株(CVCC 70502)。每头份含活菌数至少为  $1.0 \times 10^{10}$  CFU。

**【性状】** 海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。

**【作用与用途】** 用于预防羊、猪和牛布鲁氏菌病。免疫期：羊为 36 个月，牛为 24 个月，猪为 12 个月。

**【用法与用量】** 口服、皮下或肌肉注射接种。

口服 羊，每头 1 头份；牛，每头 5 头份；猪，每头 2 头份，间隔 1 个月，再口服 1 次。怀孕母畜口服后不受影响，畜群每年口服接种 1 次。长期使用，不会导致血清学的持续阳性反应。

皮下或肌肉注射 山羊，每只 0.25 头份；绵羊，每只 0.5 头份；猪，接种 2 次，每次每头 2 头份，间隔 1 个月。

**【注意事项】** （1）注射法不能用于孕畜、牛和小尾寒羊。

（2）疫苗开启后，限当日用完。

（3）拌水饮服或灌服时，应注意用凉水。若拌入饲料中，应避免使用含有添加抗生素的饲料、发酵饲料或热饲料。动物在接种前、后 3 日，应停止使用含有抗生素添加剂饲料和发酵饲料。

（4）采用注射途径接种时，应作局部消毒处理。

（5）本品对人有一定的致病力，使用时，应注意个人防护。

（6）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。用过的木槽可以用日光消毒。

**【规格】** （1）10 头份/瓶 （2）20 头份/瓶 （3）40 头份/瓶 （4）80 头份/瓶 （5）160 头份/瓶  
（6）240 头份/瓶 （7）320 头份/瓶 （8）480 头份/瓶 （9）640 头份/瓶

**【贮藏与有效期】** 2~8℃冷藏或-15℃以下保存，有效期为 12 个月。

**【包装】**

**【批准文号】**

**【生产企业】**