

# 伪狂犬病活疫苗说明书

兽用非处方药

## 【兽药名称】

通用名称：伪狂犬病活疫苗

商品名称：

英文名称：Pseudorabies Vaccine, Live

汉语拼音：Weikuanguanbing Huoyimiao

**【主要成分与含量】** 本品含伪狂犬病病毒 Bartha-K61 弱毒株。每头份病毒含量不低于  $5.0 \times 10^{3.0}$  TCID<sub>50</sub>。

**【性状】** 海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。

**【作用与用途】** 用于预防猪、牛和绵羊伪狂犬病。接种后第 6 日产生免疫力，免疫期为 12 个月。

**【用法与用量】** 肌肉注射。按瓶签注明头份，用 PBS 稀释为每毫升含 1 头份。

猪 妊娠母猪及成年猪，每头 2.0 ml；3 月龄以上仔猪及架子猪，每头 1.0 ml；乳猪，第 1 次接种 0.5 ml，断乳后再接种 1.0 ml。

牛 1 岁以上牛，每头 3.0 ml；5~12 月龄牛，每头 2.0 ml；2~4 月龄犊牛，第 1 次接种 1.0 ml，断乳后再接种 2.0 ml。

绵羊 4 月龄以上，每头 1.0 ml。

**【注意事项】** （1）疫苗开启后，限当日用完。

（2）接种时，应作局部消毒处理。

（3）妊娠母猪于分娩前 21~28 日注射为宜，其所生仔猪的母源抗体可持续 21~28 日，此后的乳猪或断乳猪仍需接种；未用本疫苗接种的母猪，其所生仔猪，可在生后 7 日内接种，并在断乳后再接种 1 次。

（4）用于绵羊免疫时，仅用于 4 月龄以上绵羊。不同品种绵羊首次免疫时，应先进行少量绵羊接种，无问题后再扩大数量进行接种。

（5）用于疫区及受到疫病威胁的地区，在疫区、疫点内，除已发病的家畜外，对无临床表现的家畜亦可进行紧急接种。

（6）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

**【规格】** （1）10 头份/瓶 （2）20 头份/瓶 （3）50 头份/瓶 （4）100 头份/瓶

**【贮藏与有效期】** 2~8℃ 保存，有效期为 9 个月；-20℃ 以下保存，有效期为 18 个月。

**【包装】**

**【批准文号】**

**【生产企业】**