

# 猪传染性胸膜肺炎三价灭活疫苗说明书

兽用非处方药

## 【兽药名称】

通用名称：猪传染性胸膜肺炎三价灭活疫苗

商品名称：

英文名称：Swine Infectious Pleuropneumonia Trivalent vaccine, Inactivated

汉语拼音：Zhu Chuanranxingxiongmoifeiyan Sanjia Miehuoyimiao

**【主要成分与含量】** 本品含灭活的 1、2、7 型猪胸膜肺炎放线杆菌（APP）血清 1 型 JL9901 株、血清 2 型 XT9904 株和血清 7 型 GZ9903 株。每种菌的 CFU 含量灭活前每头份含活菌数均  $\geq 5 \times 10^8$ /ml 不少于  $2.5 \times 10^8$ CFU。

**【性状】** 均匀乳白色乳剂。

**【作用与用途】** 用于预防 1、2、7 型胸膜肺炎放线杆菌引起的猪传染性胸膜肺炎。免疫期为 6 个月。

**【用法与用量】** （1）肌肉注射。按瓶签注明头份，不论猪只大小，各种猪均每头份 2.0ml。

（2）推荐免疫程序 仔猪 35~40 日龄进行第 1 次免疫接种，首免后 4 周加强免疫 1 次。母猪在产前 6 周和 2 周各注射 1 次，以后每 6 个月免疫 1 次。

~~**【不良反应】** 注射局部可能出现肿胀，短期可消退。一般情况下有轻微体温反应，但不引起流产、死胎和畸胎等不良反应，由于个体差异或者其他原因（如营养不良、体弱发病、潜伏感染、感染寄生虫、运输或环境应激、免疫机能减退等等），个别猪在注射后可能出现过敏反应，可用抗过敏药物（如地塞米松、肾上腺素等）进行治疗，同时采用适当的辅助治疗措施。~~

**【注意事项】** （1）本品适用于接种健康猪。

（2）疫苗瓶开封后应限当日用完。

（3）使用前应使疫苗达到室温；用前充分振摇；用于接种的工具应清洁无菌。

（4）对于爆发该病的猪场，应选用敏感药物拌料、饮水或注射，疫情控制后再全部注射疫苗。

（5）疫苗注射后，个别猪可能会出现体温升高、减食，注射部位红肿等不正常反应，一般很快自行恢复。

~~（6）注射局部可能出现肿胀，短期可消退。一般情况下有轻微体温反应，但不引起流产、死胎和畸胎等不良反应，由于个体差异或者其他原因（如营养不良、体弱发病、潜伏感染、感染寄生虫、运输或环境应激、免疫机能减退等等），个别猪在注射后可能出现过敏反应，可用抗过敏药物（如地塞米松、肾上腺素等）进行治疗，同时采用适当的辅助治疗措施。~~

**【规格】** （1）4ml/瓶 （2）6ml/瓶 （3）20ml/瓶 （4）50ml/瓶 （5）100ml/瓶

**【贮藏与有效期】** 2~8℃保存，有效期为 12 个月。

**【包装】**

**【批准文号】**

**【生产企业】**