

猪瘟活疫苗（传代细胞源）说明书

兽用非处方药

本品系用猪瘟兔化弱毒株 (CVCC AV1412) 接种易感传代细胞培养，收获细胞培养物，加适宜稳定剂，经冷冻真空干燥制成。用于预防猪瘟。

【兽药名称】

通用名称：猪瘟活疫苗（传代细胞源）

商品名称：

英文名称：Classical Swine Fever Vaccine, Live (Cell Line Origin)

汉语拼音：Zhuwen Huoyimiao (Chuandai Xibao Yuan)

【主要成分与含量】 本品系用含猪瘟兔化弱毒株 (CVCC AV1412) 接种易感传代细胞培养，收获细胞培养物，加适宜稳定剂，经冷冻真空干燥制成。每头份含细胞毒液不少于 0.015ml。

【性状】 淡黄色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防猪瘟。断奶后无母源抗体的仔猪的免疫期为 12 个月。

【用法与用量】 肌肉或皮下注射。

(1) 按瓶签注明头份，用灭菌生理盐水稀释成 1 头份/ml，每头 1.0ml。

(2) 在没有猪瘟流行的地区，断奶后无母源抗体的仔猪，接种 1 次即可。有疫情威胁时，仔猪可在 21~30 日龄和 65 日龄左右各接种 1 次。

【注意事项】 (1) 本品仅用于接种健康猪只。

(2) 接种后应注意观察，如出现过敏反应，应及时注射抗过敏药物治疗。

(3) 疫苗应在 8℃ 以下的冷藏条件下运输。

(4) 使用单位收到冷藏包装的疫苗后，如保存环境超过 8℃ 而在 25℃ 以下时，从接到疫苗时算起，应在 10 日内用完。

(5) 使用单位所在地区的气温在 25℃ 以上时，如无冷藏条件，应采用冰瓶领取疫苗，随领随用。

(6) 疫苗稀释后，如气温在 15℃ 以下，应在 6 小时内用完；如气温在 15~25℃，则应在 3 小时内用完。

(7) 接种时，应做局部消毒处理。每接种 1 头猪更换 1 支针头。

(8) 用过的疫苗瓶、器具和稀释后剩余未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】 (1) 10 头份/瓶 (2) 20 头份/瓶 (3) 40 头份/瓶 (4) 50 头份/瓶 (5) 100 头份/瓶

【贮藏与有效期】 -15℃ 以下避光保存，有效期为 18 个月。

【包装】

【批准文号】

【生产企业】