

鸡球虫病三价活疫苗（柔嫩艾美耳球虫 PTMZ 株+巨型艾美耳球虫 PMHY 株+堆型艾美耳球虫 PAHY 株）说明书

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称：鸡球虫病三价活疫苗（柔嫩艾美耳球虫 PTMZ 株+巨型艾美耳球虫 PMHY 株+堆型艾美耳球虫 PAHY 株）

商品名称：

英文名称：Coccidiosis Trivalent Vaccine for Chickens, Live (*E.tenella* Strain-PTMZ-Strain, *E.maxima* Strain PMHY Strain and *E.acervulina* Strain PAHY-Strain)

汉语拼音：Ji Qiuchongbing Sanjia Huoyimiao (Rounen'aimeierqiuchong PTMZ Zhu + Juxing'aimeierqiuchong PMHY Zhu + Duixing'aimeierqiuchong PAHY Zhu)

【主要成分与含量】 本品含柔嫩艾美耳球虫（PTMZ 株）、巨型艾美耳球虫（PMHY 株）和堆型艾美耳球虫（PAHY 株）三种球虫卵囊，~~一~~。每羽份疫苗含有孢子化卵囊 400 个~~±10%~~ **40 个 ±10%**。

【性状】 ~~白色或类白色溶液~~ **均匀液体**，静置后底部有少量沉淀。

【作用与用途】 用于预防肉鸡球虫病。接种后 14 日开始产生免疫力，免疫力可持续至饲养期末。

【用法与用量】 （1）免疫接种程序 用于 3~7 日龄鸡饮水免疫。

（2）接种方法及剂量 饮水接种。每鸡 1 羽份。每瓶 1000 羽份（或 2000 羽份）的疫苗兑加水 **6.0 L**（或 12 L），加入 **1 瓶**（50 g/瓶或 100 g/瓶）的球虫疫苗助悬剂，配成混悬液 ~~1 瓶~~。供 1000 羽（或 2000 羽）雏鸡自由饮用，平均每只鸡饮用 **6.0 ml** 球虫疫苗混悬液，约 4~6 小时饮用完毕。

~~【不良反应】 接种疫苗后 12~14 日，个别鸡只可能会出现拉血粪的现象，不需用药。如果出现严重血粪或球虫病死亡鸡，则用磺胺喹噁啉或磺胺二甲嘧啶按推荐剂量投药 1~2 日，即可控制。~~

【注意事项】 （1）本品严禁结冻或在靠近热源的地方存放。~~仅用于接种健康雏鸡，使用时应充分摇匀。~~

（2）仅用于接种健康雏鸡，使用时应充分摇匀。

（23）对饲料中药物使用的要求 严禁在饲料中添加任何抗球虫药物。

（34）对扩栏与垫料管理的要求 ①建议不要逐日扩栏，接种球虫疫苗后第 7 日，将育雏面积“一步到位”地扩大到免疫接种后第 17 日所需的育雏面积，以利于鸡群获得均匀的重复感染机会。②接种球虫疫苗后的第 8~16 日内不可更换垫料。③垫料的湿度以 25%~30%（用手抓起一把垫料时，手心有微潮的感觉）为宜。

（45）做好免疫抑制性疾病的预防和控制工作 许多免疫抑制性疾病如传染性法氏囊病、马立克氏病、霉菌毒素中毒等，会严重影响抗球虫免疫力的建立，加重疫苗的反应。应避免这些疾病对疫苗免疫效果的

干扰。

(56) 减少应激因素的影响 免疫接种球虫疫苗后的第 12~14 日~~是~~是疫苗反应较强的阶段，在此期间应尽量避免断喙、注射其他疫苗和迁移鸡群。

(7) 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

(8) 接种疫苗后 12~14 日，个别鸡只可能会出现拉血粪的现象，不需用药。如果出现严重血粪或球虫病死鸡，则用磺胺喹噁啉或磺胺二甲嘧啶按推荐剂量投药 1~2 日，即可控制。

【规格】 (1) 1000 羽份/瓶 (2) 2000 羽份/瓶

【贮藏与有效期】 在-2~8℃保存，有效期为 6 个月。

【包装】

【批准文号】

【生产企业】