

## 利福昔明乳房注入剂(干乳期)说明书

兽用非处方药

### 【兽药名称】

通用名称：利福昔明乳房注入剂(干乳期)

商品名称：

英文名称：Rifaximin Intramammary Infusion(Dry Cow)

汉语拼音：Lifuximing Rufang Zhuruji( Ganruqi)

【主要成分】 利福昔明

【性状】 本品为橘红色至暗红色油性混悬液。

【药理作用】 利福昔明是利福霉素 SV 的半合成衍生物。其主要通过与细菌依赖 DNA 的 RNA 聚合酶中  $\beta$ -亚单位不可逆地结合，来抑制细菌 RNA 的合成，从而达到杀菌的目的。其对革兰氏阳性菌(如金黄色葡萄球菌、无乳链球菌、停乳链球菌、乳房链球菌、棒状杆菌等)和革兰氏阴性菌(如大肠杆菌等)均有良好的抗菌活性。

【作用与用途】 主要用于预防由敏感菌(金黄色葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌等)引起的干乳期奶牛乳房炎。

【用法与用量】 乳管注入：干乳期奶牛，每乳室 1 支。

【不良反应】 按推荐剂量使用，未见不良反应。

【注意事项】 (1) 仅用于干乳期奶牛。

(2) 皮肤接触本品可能引起过敏反应，使用后洗手。

(3) 使用前将药液摇匀。

【休药期】 产犊前 60 天给药，弃奶期 0 天

【规格】 按  $C_{43}H_{51}N_3O_{11}$  计算 5g : 0.1g

【包装】

【贮藏】 遮光，密闭，在 25℃ 以下保存。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】