

## 盐酸林可霉素乳房注入剂（泌乳期）说明书

兽用处方药

### 【兽药名称】

通用名称：盐酸林可霉素乳房注入剂（泌乳期）

商品名称：

英文名称：Lincomycin Hydrochloride Intramammary Infusion (Lactating Cow)

汉语拼音：Yansuanlinkemeisu Rufang Zhuruji (Mirusi)

【主要成分】 盐酸林可霉素

【性状】 本品为淡黄色油状混悬液。

【药理作用】 林可霉素属林可胺类抗生素，属抑菌剂，敏感菌包括金黄色葡萄球菌（包括耐青霉素菌株）、链球菌、肺炎球菌、炭疽杆菌、猪丹毒丝菌、某些支原体（猪肺炎支原体、猪鼻支原体、猪滑液囊支原体）、钩端螺旋体和厌氧菌（如梭杆菌、破伤风梭菌、产气荚膜梭菌及放线菌等）。主要作用于细菌核糖体的 50S 亚基，通过抑制肽链的延长影响蛋白质的合成而发挥抗菌作用。

【作用与用途】 林可胺类抗生素。用于牛由金黄色葡萄球菌、无乳链球菌、停乳链球菌等敏感菌引起的临床型乳房炎和隐性乳房炎。

【用法与用量】 乳管内灌注：挤奶后每个乳区 1 支。一日 2 次，连用 2~3 次。

【不良反应】 按规定的用法与用量使用尚未见不良反应。

【注意事项】（1）用药时务必将奶挤干净，对于化脓性炎症可用乳导管排出脓汁等炎症分泌物，以保证药物疗效。

（2）注药时务必将注射器头部完全送入乳池。

【休药期】 弃奶期 7 日。

【规格】 按  $C_{18}H_{34}N_2O_6S$  计算 7.0g: 0.35g

【包装】

【贮藏】 遮光，密封，在干燥处保存。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】