

## 五皮散

Wupi San

**【处方】** 桑白皮 30g            陈皮 30g            大腹皮 30g            姜皮 15g  
茯苓皮 30g

**【制法】** 以上 5 味，粉碎，过筛，混匀，即得。

**【性状】** 本品为黄褐色的粉末；气微香，味辛。

**【鉴别】** (1) 取本品，置显微镜下观察：纤维无色，直径 13~26 $\mu\text{m}$ ，壁厚，孔沟不明显（桑白皮）。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中（陈皮）。中果皮纤维成束，细长，直径 8~15 $\mu\text{m}$ ，微木化，纹孔明显，周围细胞中含有圆簇状硅质块，直径约 8 $\mu\text{m}$ （大腹皮）。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 4~6 $\mu\text{m}$ （茯苓皮）。

新增 (2) 取本品 2g，加甲醇 10ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取橙皮苷对照品，加甲醇制成饱和溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 0502）试验，吸取上述两种溶液各 3 $\mu\text{l}$ ，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-水（100:17:13）为展开剂，展至约 3cm，取出，晾干，再以甲苯-乙酸乙酯-甲酸-水（20:10:1:1）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应位置上，显相同颜色的荧光斑点。

**【检查】** 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 0101）。

**【功能】** 行气，化湿，利水。

**【主治】** 水肿。

**【用法与用量】** 马、牛 120~240g；羊、猪 45~60 g。

**【贮藏】** 密闭，防潮。