

补中益气散

Buzhong Yiqi San

【处方】 炙黄芪 75g 党参 60g 白术（炒） 60g 炙甘草 30g
 当归 30g 陈皮 20g 升麻 20g 柴胡 20g

【制法】 以上 8 味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为淡黄棕色的粉末；气香，味辛、甘、微苦。

【鉴别】 （1）取本品，置显微镜下观察：纤维成束或散离，壁厚，表面有纵裂纹，两端断裂成帚状或较平截。联结乳管直径 $12\sim 15\mu\text{m}$ ，含细小颗粒状物。草酸钙针晶细小，长 $10\sim 32\mu\text{m}$ ，不规则地充塞于薄壁细胞中。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。木纤维成束，多碎断，淡黄绿色，末端狭尖或钝圆，有的有分叉，直径 $14\sim 41\mu\text{m}$ ，壁稍厚，具十字形纹孔对，有的胞腔中含黄棕色物。油管含淡黄色或黄棕色条状分泌物，直径 $8\sim 25\mu\text{m}$ 。

（2）取本品 45.5g ，加正己烷 10ml ，超声处理 15 分钟，滤过，滤液低温浓缩至 2ml ，作为供试品溶液。另取白术对照药材 $0.20.5\text{g}$ ，加正己烷 25ml ，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录 0502）试验，吸取上述两种新制备的两种溶液各 $405\mu\text{l}$ ，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（ $60\sim 90^\circ\text{C}$ ）-乙酸乙酯（ $50:1$ ）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 香草醛硫酸溶液， 60°C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，~~显相同颜色的斑点~~应显有一桃红色主斑点（苍术酮）。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 0101）。

【功能】 补中益气，升阳举陷。

【主治】 脾胃气虚，久泻，脱肛，子宫脱垂。

【用法与用量】 马、牛 $250\sim 400\text{g}$ ；羊、猪 $45\sim 60\text{g}$ 。

【贮藏】 密闭，防潮。