

苍术香连散

Cangzhu Xianglian San

【处方】 黄连 30g 木香 20g 苍术 60g

【制法】 以上3味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为棕黄色的粉末；气香，味苦。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：纤维束鲜黄色，壁稍厚，纹孔明显。木纤维长梭形，直径16~24 μm，壁稍厚，纹孔口横裂缝状、十字状或人字状。草酸钙针晶细小，长5~32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。

(2) 取本品1 g，加~~乙~~甲醇10 ml，~~加热回流1小时，放冷~~超声处理15分钟，滤过，取滤液作为供试品溶液。另取黄连对照药材0.50.2 g，同法制成对照药材溶液。再取盐酸小檗碱对照品，加~~乙~~甲醇制成每1 ml含40.5 mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录0502)试验，吸取上述三种溶液各5 μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以~~正丁醇-冰醋酸-水~~环己烷-乙酸乙酯-异丙醇-甲醇-水-三乙胺(~~7-1-23~~ : 3.5 : 1 : 1.5 : 0.5 : 1)为展开剂，置氨蒸气饱和的展开缸内，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

(3) 取本品1.5 g，加甲醇10 ml，超声处理15分钟，滤过，取滤液作为供试品溶液。另取苍术对照药材0.8 g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录0502)试验，吸取供试品溶液和对照药材溶液各5 μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚(60~90℃)-丙酮(9:2)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的污绿色主斑点(苍术素)。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录0101)。

【功能】 清热燥湿。

【主治】 下痢，湿热泄泻。

【用法与用量】 马、牛90~120 g；羊、猪15~30 g。

【贮藏】 密闭，防潮。