

# 大戟散

Daji San

【处方】 京大戟 30g                  滑石 90g                  甘遂 30g                  牵牛子 60g  
            黄芪 45g                  玄明粉 200g              大黄 60g

【制法】 以上7味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为黄色的粉末；气辛香，味咸、涩。

【鉴别】(1) 取本品，置显微镜下观察：不规则块片无色，有层层剥落痕迹。纤维成束或散离，壁厚，表面有纵裂纹，两端断裂成帚状或较平截。草酸钙簇晶大，直径60~140 $\mu$ m。分泌腔类圆形或长圆形，直径30~150 $\mu$ m，周围子叶细胞扁圆形，腔内含油滴。

(2) 取本品1g，加甲醇20ml，浸渍1小时，时时振摇，滤过，取滤液5ml，蒸干，残渣加水10ml使溶解，再加盐酸1ml，加热回流30分钟，立即冷却，用乙醚分2次振摇提取，每次20ml，合并乙醚液，蒸干，残渣加三氯甲烷1ml使溶解，作为供试品溶液。另取大黄对照药材0.1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录0502）试验，吸取上述两种溶液各5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶H薄层板上，以石油醚（30~60 $^{\circ}$ C）-甲酸乙酯-甲酸（85%）（15：5：1）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的五个橙黄色荧光主斑点；置氨蒸气中熏后，日光下检视，斑点变为红色。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录0101）。

【功能】 泻下，逐水。

【主治】 水草腹胀，宿草不转。

【用法与用量】 牛150~300g，加猪油250g。

【贮藏】 密闭，防潮。