

# 蛋鸡宝

Danjibao

【处方】 党参 100g      黄芪 200g      茯苓 100g      白术 100g  
          麦芽 100g      山楂 100g      六神曲 100g      菟丝子 100g  
          蛇床子 100g      淫羊藿 100g

【制法】 以上10味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为**黄浅**棕色的粉末；气微香，味甘、微辛。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：联结乳管直径12~15 μm，含细小颗粒状物。纤维成束或散离，壁厚，表面有纵裂纹，两端断裂成帚状或较平截。不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径4~6 μm。草酸钙针晶细小，长10~32 μm，不规则地充塞于薄壁细胞中。非腺毛3~10细胞，长200~1000 μm，顶端细胞长，有的含棕色或黄棕色物。果皮细胞纵列，常有1个长细胞与2个短细胞相间排列，长细胞壁厚，波状弯曲，木化。果皮石细胞淡紫红色、红色或黄棕色，类圆形或多角形，直径约至125 μm。种皮栅状细胞2列，内列较外列长，有光辉带。

(2) 取本品6g，加70%乙醇20ml，超声处理30分钟，离心10分钟，取上清液滤过，滤液蒸干，残渣加水20ml使溶解，用乙醚振摇提取2次，每次20ml，弃去乙醚液，用水饱和正丁醇振摇提取2次，每次20ml，合并正丁醇液，用1%氢氧化钠溶液洗涤3次，每次20ml，再用正丁醇饱和水洗涤2次，每次20ml，将正丁醇液蒸干，残渣加乙醇2ml使溶解，加适量聚酰胺拌匀，水浴蒸干，加在聚酰胺柱(5g，粒径80-100目，内径1.5cm)上，用水100ml洗脱，弃去洗脱液，再用乙醇50ml洗脱，收集洗脱液，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取淫羊藿苷对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录0502)试验，吸取供试品溶液5μl，对照品溶液2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水(13:7:3)的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。置紫外光灯(365nm)下检视，供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的颜色的荧光斑点。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录0101)。

【功能】 益气健脾，补肾壮阳。

【主治】 用于提高产蛋率，延长产蛋高峰期。

【用法与用量】 混饲：每1kg饲料 鸡20g。

【贮藏】 密闭，防潮。