

鸡痢灵散

Jililing San

【处方】 雄黄10g 藿香10g 白头翁15g 滑石10g
 马尾连15g 诃子15g 马齿苋15g 黄柏10g

【制法】 以上8味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为棕黄色的粉末；气微，味苦。

【鉴别】（1）取本品，置显微镜下观察：不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。非腺毛1~4细胞，壁有疣状突起。非腺毛单细胞，直径13~33 μ m，基部稍膨大，壁大多木化，有的可见螺状或双螺状纹理。草酸钙簇晶直径7~37 μ m，存在于叶肉组织中。纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。果皮纤维层淡黄色，斜向交错排列，壁较薄，有纹孔。不规则块片无色，有层层剥落痕迹。

（2）取本品0.2g，加水湿润后加氯酸钾饱和的硝酸溶液2ml，振摇，滤过，滤液加10%氯化钡溶液，生成白色沉淀。放置后，倾出上层酸液，再加水2ml，振摇，沉淀不溶解。

（3）取本品1g，加甲醇10ml，~~加热回流15~~超声处理20分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取盐酸小檗碱对照品，加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录0502）试验，吸取上述两种溶液各2 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以~~苯环己烷~~乙酸乙酯-甲醇-异丙醇-~~浓氨试液水~~-三乙胺（~~6+3+1.5+1.5+0.5~~3:3.5:1:1.5:0.5:1）为展开剂，置氨蒸气饱和的展开缸内，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的一个黄色荧光斑点。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录0101）。

【功能】 清热解毒，涩肠止痢。

【主治】 雏鸡白痢。

【用法与用量】 雏鸡0.5g。

【贮藏】 密闭，防潮。