

理中散

Lizhong San

【处方】 党参 60g 干姜 30g 甘草 30g 白术 60g

【制法】 以上 4 味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为淡黄色至黄色的粉末；气香，味辛、微甜。

【鉴别】（1）取本品，置显微镜下观察：联结乳管直径 12~15 μm ，含细小颗粒状物。淀粉粒长卵形、广卵形或形状不规则，有的较小端略尖凸，直径 25~32 μm ，长约至 50 μm ，脐点点状，位于较小端。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。草酸钙针晶细小，长 10~32 μm ，不规则地充塞于薄壁细胞中。

（2）取本品 3g，加正己烷 10 ml，超声 15 分钟，滤过，滤液作为供试品溶液，另取白术对照药材 40.5g，加正己烷 5 ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录 0502）试验，吸取上述新制备的两种溶液各 5 μl ，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90 $^{\circ}\text{C}$ ）-乙酸乙酯（50 : 1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 香草醛硫酸溶液，60 $^{\circ}\text{C}$ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，~~显相同颜色的斑点，~~并应显有一桃红色主斑点（苍术酮）。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 0101）。

【功能】 温中散寒，补气健脾。

【主治】 脾胃虚寒，食少，泄泻，腹痛。

【用法与用量】 马、牛 200~300g；羊、猪 30~60g。

【贮藏】 密闭，防潮。