

# 泰山盘石散

Taishan Panshi San

【处方】 党参 30g            黄芪 30g            当归 30g            续断 30g  
          黄芩 30g            川芎 15g            白芍 30g            熟地黄 45g  
          白术 30g            砂仁 15g            炙甘草 12g

【制法】 以上 11 味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为淡棕色的粉末；气微香，味甘。

【鉴别】(1) 取本品，置显微镜下观察：纤维成束或散离，壁厚，表面有纵裂纹，两端断裂成帚状或较平截。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，具极微细的斜向交错纹理。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。草酸钙簇晶直径 18~32 $\mu$ m，存在于薄壁细胞中，常排列成行或一个细胞含数个簇晶。草酸钙针晶细小，长 10~32 $\mu$ m，不规则地充塞于薄壁细胞中。内种皮石细胞黄棕色或棕红色，表面观类多角形，壁厚，胞腔含硅质块。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

(2) 取本品 ~~5~~10g，加正己烷 20 ml，超声处理 ~~30~~15 分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取白术对照药材 0.5g，加正己烷 5ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录 0502) 试验，吸取上述~~两种溶液各 10 $\mu$ l~~，新制备的供试品溶液 10 $\mu$ l、对照药材溶液 5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚(60~90 $^{\circ}$ C)-乙酸乙酯(50 : 1) 为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 香草醛硫酸溶液，60 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材相应的位置上，~~显相同颜色的斑点，并~~应显有一桃红色的主斑点(苍术酮)。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 0101)。

【功能】 补气血，安胎。

【主治】 气血两虚所致胎动不安，习惯性流产。

【用法与用量】 马、牛 250~350 g；羊、猪 60~90 g；犬、猫 5~15 g。

【贮藏】 密闭，防潮。