

## 五苓散

Wuling San

【处方】 茯苓 100g                      泽泻 200g                      猪苓 100g                      肉桂 50g  
                    白术（炒）100g

【制法】 以上5味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为淡黄色的粉末；气微香，味甘、淡。

【鉴别】（1）取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径4~6 $\mu$ m。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。菌丝黏结成团，大多无色；草酸钙方晶正八面体形，直径32~60 $\mu$ m。草酸钙针晶细小，长10~32 $\mu$ m，不规则地充塞于薄壁细胞中。石细胞类方形或类圆形，壁一面菲薄。

（2）取本品5.5g，加乙醇30ml，冷浸20分钟，时时振摇，滤过，滤液作为供试品溶液。另取桂皮醛对照品，加乙醇制成每1ml含1 $\mu$ l的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录0502）试验，吸取供试品溶液2~5 $\mu$ l，对照品溶液2 $\mu$ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚（60~90 $^{\circ}$ C）-乙酸乙酯（17:3）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以二硝基苯肼乙醇试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

（3）取本品35.5g，加正己烷10ml，超声处理15分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取白术对照药材0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录0502）试验，吸取上述新制备的两种溶液各405 $\mu$ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚（60~90 $^{\circ}$ C）-乙酸乙酯（50:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%香草醛硫酸溶液，60 $^{\circ}$ C加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，~~显相同颜色的斑点，~~并应显有一桃红色主斑点（苍术酮）。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录0101）。

【功能】 温阳化气，利湿行水。

【主治】 水湿内停，排尿不利，泄泻，水肿，宿水停脐。

【用法与用量】 马、牛150~250g；羊、猪30~60g。

【贮藏】 密闭，防潮。