

# 猪苓散

Zhuling San

【处方】 猪苓 30g                      泽泻 45g                      肉桂 45g                      干姜 60g  
                    天仙子 20g

【制法】 以上5味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为淡棕色粉末；气香，味辛。

【鉴别】(1) 取本品，置显微镜下观察：菌丝黏结成团，大多无色；草酸钙方晶正八面体形，直径32~60  $\mu\text{m}$ 。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群。石细胞类圆形或类长方形，壁一面菲薄。淀粉粒长卵形、广卵形或形状不规则，有的较小端略尖凸，直径25~32  $\mu\text{m}$ ，长约至50  $\mu\text{m}$ ，脐点点状，位于较小端。种皮外表皮细胞淡黄色，椭圆形或类长方形，长100~150  $\mu\text{m}$ ，直径50~100  $\mu\text{m}$ ，细胞壁呈波状突起，显透明波状纹理。

(2) 取本品2.5g，加乙醇10ml，冷浸20分钟，时时振摇，滤过，滤液作为供试品溶液。另取桂皮醛对照品，加乙醇制成每1ml含1 $\mu\text{l}$ 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法试验，吸取对照品溶液2 $\mu\text{l}$ 、供试品溶液5 $\mu\text{l}$ ，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚（60~90 $^{\circ}\text{C}$ ）-乙酸乙酯（17:3）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以二硝基苯胍乙醇试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录0101）。

【功能】 利水止泻，温中散寒。

【主治】 冷肠泄泻。

【用法与用量】 马、牛 200~250 g。

【注意】 孕畜忌服。

【贮藏】 密闭，防潮。