

# 平胃散

Pingwei San

【处方】 苍术 80g            厚朴 50g            陈皮 50g            甘草 30g

【制法】 以上 4 味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为棕黄色粉末；气香，味苦、微甜。

【鉴别】（1）取本品，置显微镜下观察：草酸钙针晶细小，长 5~32 $\mu$ m，不规则地充塞于薄壁细胞中。石细胞分枝状，壁厚，层纹明显。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。纤维束周围薄壁细胞含有草酸钙方晶，形成晶纤维。

（2）取本品 1.5g，加乙醚 15ml，置具塞烧瓶中，振摇 20 分钟，滤过，滤液低温挥去乙醚，残渣加乙酸乙酯 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取苍术对照药材 0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90 $^{\circ}$ C）-乙酸乙酯（20 : 0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 对二甲氨基苯甲醛的 10% 硫酸乙醇溶液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的污绿色主斑点（苍术素）。

（3）取本品 1.5g，加甲醇 5ml，密塞，振摇 30 分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取厚朴对照药材 0.3g，同法制成对照药材酚对照品与和厚朴酚对照品，加甲醇制成每 1ml 各含 1mg 的混合溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法试验（附录 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5~8 $\mu$ l，分别点于同一高效硅胶 GF<sub>254</sub> 薄层板上，以石油醚（30~60 $^{\circ}$ C）-乙酸乙酯（3 : 1）三氯甲烷-苯-乙酸乙酯（5 : 4 : 1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254 nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的两个主斑点。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 0101）。

【功能】 燥湿健脾，理气开胃。

【主治】 湿困脾土，食少，粪稀软。

【用法与用量】 马、牛 200~250 g；羊、猪 30~60 g。

【贮藏】 密封，防潮。