

注射用阿莫西林钠说明书（草案）

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：注射用阿莫西林钠

商品名称：

英文名称：Amoxicillin Sodium for Injecion

汉语拼音：Zhusheyong Amoxilinna

【主要成分】阿莫西林钠

【性状】本品为白色或类白色结晶或粉末。

【药理作用】 β -内酰胺类抗生素。阿莫西林为半合成广谱青霉素，通过抑制细菌胞壁黏肽合成而发挥杀菌作用。对肺炎链球菌、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、巴氏杆菌、沙门氏菌属、流感嗜血杆菌等具有良好的抗菌活性，可用于治疗对阿莫西林敏感的革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌感染。

【作用与用途】 β -内酰胺类抗生素。主要用于治疗对阿莫西林敏感的革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌感染。

【用法与用量】以阿莫西林计。皮下或肌肉注射：一次量，每 1kg 体重，家畜 5~10mg。一日 2 次，连用 3~5 日。

【不良反应】偶见过敏反应，注射部位有刺激性。

【注意事项】对青霉素过敏的动物禁用。

【休药期】家畜 14 日。

【规格】按 $C_{16}H_{19}N_3O_5S$ 计算 (1) 0.5g (2) 1g (3) 2g (4) 4g

【包装】

【贮藏】遮光，密封保存。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

注射用阿莫西林钠质量标准（草案）

【作用与用途】 β -内酰胺类抗生素。主要用于治疗对阿莫西林敏感的革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌感染。

【用法与用量】以阿莫西林计。皮下或肌肉注射：一次量，每 1kg 体重，家畜 5~10mg。一日 2 次，连用 3~5 日。

【不良反应】偶见过敏反应，注射部位有刺激性。

【注意事项】对青霉素过敏的动物禁用。

【休药期】家畜 14 日。

【规格】按 $C_{16}H_{19}N_3O_5S$ 计算（1）0.5g （2）1g （3）2g （4）4g

【贮藏】遮光，密封保存。