

盐酸头孢噻呋乳房注入剂（干乳期）说明书（草案）

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：盐酸头孢噻呋乳房注入剂(干乳期)

商品名称：

英文名称：Ceftiofur Hydrochloride Intramammary Infusion (Dry Cow)

汉语拼音：Yansuan Toubaosai fu Rufang Zhuruji (Ganruqi)

【主要成分】盐酸头孢噻呋

【性状】本品为类白色至淡黄色油性混悬液，久置分层。

【药理作用】β-内酰胺类抗生素。通过干扰肽聚糖合成酶而抑制细菌细胞壁的合成，达到杀灭细菌的作用，头孢噻呋对金黄色葡萄球菌、停乳链球菌、乳房链球菌和大肠埃希菌等有良好的抗菌活性。

【作用与用途】β-内酰胺类抗生素。用于预防和治疗由金黄色葡萄球菌、停乳链球菌、乳房链球菌和大肠埃希菌等细菌引起的奶牛干乳期乳房炎。

【用法与用量】乳管注入：干乳期奶牛，在最后一次挤奶后，每个乳室注入本品1支。

【不良反应】可能引起动物的过敏反应。

【注意事项】（1）仅用于干乳期奶牛。

（2）使用前将药液摇匀，一次性注入乳管中。

（3）对β-内酰胺类抗生素过敏的动物禁用，

（4）对此类药物有过敏反应者请避免直接接触此产品。

（5）给药前，乳汁要完全挤出，用干净的毛巾擦净乳头；给药后，轻轻按摩乳房，使药物完全扩散。

（6）置儿童无法触及处。

【休药期】产犊前60天给药，弃奶期0天。牛16日。

【规格】按 $C_{19}H_{17}N_5O_7S_3$ 计算（1）10ml：500mg（2）8ml：500mg

【包装】

【贮藏】

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

盐酸头孢噻呋乳房注入剂（干乳期）质量标准（草案）

【作用与用途】 β -内酰胺类抗生素。用于预防和治疗由金黄色葡萄球菌、停乳链球菌、乳房链球菌和大肠埃希菌等细菌引起的奶牛干乳期乳房炎。

【用法与用量】乳管注入：干乳期奶牛，在最后一次挤奶后，每个乳室注入本品 1 支。

【不良反应】可能引起动物的过敏反应。

【注意事项】（1）仅用于干乳期奶牛。

（2）使用前将药液摇匀，一次性注入乳管中。

（3）对 β -内酰胺类抗生素过敏的动物禁用，

（4）对此类药物有过敏反应者请避免直接接触此产品。

（5）给药前，乳汁要完全挤出，用干净的毛巾擦净乳头；给药后，轻轻按摩乳房，使药物完全扩散。

（6）置儿童无法触及处。

【休药期】产犊前 60 天给药，弃奶期 0 天。牛 16 日。

【规格】按 $C_{19}H_{17}N_5 O_7 S_3$ 计算 （1）10ml：500mg （2）8ml：500mg

【贮藏】