

头孢噻呋注射液说明书（草案）

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：头孢噻呋注射液

商品名称：

英文名称：Ceftiofur Injection

汉语拼音：Toubaosaifu Zhusheye

【主要成分】头孢噻呋

【性状】本品为细微颗粒的混悬液，静置后细微颗粒下沉，振摇后成均匀的灰白色至灰褐色的混悬液。

【药理作用】头孢噻呋属 β -内酰胺类抗生素，为畜禽专用抗生素，广谱杀菌作用。对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌(包括产 β -内酰胺酶菌)均有效。敏感菌主要有多杀性巴氏杆菌、溶血性巴氏杆菌、胸膜肺炎放线杆菌、沙门氏菌、大肠杆菌、链球菌、葡萄球菌等，某些绿脓杆菌、肠球菌耐药。

【作用与用途】用于治疗猪细菌性呼吸道感染，如猪副猪嗜血杆菌病。

【用法与用量】以本品计。肌内注射：一次量，每 1kg 体重，猪 0.1ml，三日 1 次，连用 2 次。

【不良反应】(1) 可能引起胃肠道菌群紊乱或二重感染。

(2) 有一定肾毒性。

(3) 可能出现一过性疼痛。

【注意事项】(1) 使用前充分摇匀。

(2) 对肾功能不全动物应调整剂量。

(3) 对 β -内酰胺类抗生素高敏的人应避免接触本品，避免儿童接触。

【休药期】猪 5 日

【规格】按 $C_{19}H_{17}N_5O_7S_3$ 计 (1)10ml: 0.5g (2)20ml: 1.0g (3)50ml: 2.5g (4)100ml: 5.0g

【包装】

【贮藏】

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

头孢噻呋注射液说明书（草案）

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：头孢噻呋注射液

商品名称：

英文名称：Ceftiofur Injection

汉语拼音：Toubaosaifu Zhusheye

【主要成分】头孢噻呋

【性状】本品为细微颗粒的混悬液，静置后细微颗粒下沉，振摇后成均匀的灰白色至灰褐色的混悬液。

【药理作用】头孢噻呋属 β -内酰胺类抗生素，为畜禽专用抗生素，广谱杀菌作用。对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌(包括产 β -内酰胺酶菌)均有效。敏感菌主要有多种杀性巴氏杆菌、溶血性巴氏杆菌、胸膜肺炎放线杆菌、沙门氏菌、大肠杆菌、链球菌、葡萄球菌等，某些绿脓杆菌、肠球菌耐药。

【作用与用途】 β -内酰胺类抗生素。用于治疗猪细菌性呼吸道感染，如猪副猪嗜血杆菌病。

【用法与用量】以本品计。肌肉注射：一次量，每 1kg 体重猪 0.05ml，三日 1 次，连用 2 次。

【不良反应】(1) 可能引起胃肠道菌群紊乱或二重感染。

(2) 有一定肾毒性。

(3) 可能出现一过性疼痛。

【注意事项】(1) 使用前充分摇匀。

(2) 对肾功能不全动物应调整剂量。

(3) 对 β -内酰胺类抗生素高敏的人应避免接触本品，避免儿童接触。

【休药期】猪 5 日

【规格】按 $C_{19}H_{17}N_5O_7S_3$ 计(1) 10ml: 1.0g (2) 20ml: 2.0g (3) 50ml: 5.0g (4) 100ml: 10.0g

【包装】

【贮藏】

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

头孢噻呋注射液质量标准（草案）

【作用与用途】 β -内酰胺类抗生素。用于治疗猪细菌性呼吸道感染，如猪副猪嗜血杆菌病。

【用法与用量】以头孢噻呋计。肌内注射：一次量，每 1kg 体重，猪 5mg，三日 1 次，连用 2 次。

【不良反应】（1）可能引起胃肠道菌群紊乱或二重感染。

（2）有一定肾毒性。

（3）可能出现一过性疼痛。

【注意事项】（1）使用前充分摇匀。

（2）对肾功能不全动物应调整剂量。

（3）对 β -内酰胺类抗生素高敏的人应避免接触本品，避免儿童接触。

【休药期】猪 5 日

【规格】按 $C_{19}H_{17}N_5O_7S_3$ 计 (1)10ml: 0.5g (2)20ml: 1.0g (3)50ml: 2.5g (4)100ml: 5.0g (5)10ml: 1.0g (6)20ml: 2.0g (7)50ml: 5.0g (8)100ml: 10.0g

【贮藏】