

马波沙星片说明书（草案）

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：马波沙星片

商品名称：

英文名称：Marbofloxacin Tablets

汉语拼音：Maboshaxing Pian

【主要成分】马波沙星。

【性状】本品为类白色片。

【药理作用】**药效学** 马波沙星为氟喹诺酮类抗菌药。通过抑制细菌 DNA 拓扑异构酶而发挥作用。其抗菌谱广，对革兰氏阳性菌(尤其是葡萄球菌和链球菌)、革兰氏阴性菌(大肠杆菌、沙门氏菌、变形杆菌、摩氏摩根菌、弗氏柠檬酸杆菌、阴沟肠杆菌、粘质沙雷氏菌、克雷伯杆菌、志贺氏菌、巴斯德氏菌、嗜血杆菌属、莫拉氏菌属、假单胞菌和犬布鲁氏菌)和支原体均有效。

药动学 按 2mg/kg 的剂量内服给药，马波沙星迅速被吸收，1.5 小时可达血药峰浓度，生物利用度为 88.94%，马波沙星与血浆蛋白的结合率很低(<10%)，广泛分布于整个机体。在大多数组织(肾、肝、皮肤、肺、膀胱和消化道)的浓度均高于血浆中的药物浓度。马波沙星在体内消除缓慢，犬的半衰期为 15h，主要以活性形式排出，2/3 从尿液排出，1/3 从粪便排出。

药物相互作用 (1) 同时内服铝、钙、铁、镁等金属阳离子可能会降低马波沙星的生物利用度。

(2) 与茶碱同时给药时需减少茶碱的使用剂量。

【作用与用途】氟喹诺酮类抗菌药。用于治疗由肺炎链球菌等敏感菌引起的犬呼吸道感染。

【用法与用量】内服：一次量，每 1kg 体重，犬 0.4 片，急性呼吸道感染连续用药 7 天，慢性呼吸道感染连续用药 21 天。

【不良反应】在治疗期间可能会出现轻度的呕吐，粪便软化，口渴和多动症状，停药后上述症状会消失。

【注意事项】(1) 本品适用于 1 岁以上的小型犬，1.5 岁以上的大型犬。

(2) 孕犬及哺乳犬慎用。

【规格】5mg

【包装】

【贮藏】遮光，密封，在干燥处保存。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

马波沙星片说明书（草案）

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：马波沙星片

商品名称：

英文名称：Marbofloxacin Tablets

汉语拼音：Maboshaxing Pian

【主要成分】马波沙星。

【性状】本品为类白色片。

【药理作用】**药效学** 马波沙星为氟喹诺酮类抗菌药。通过抑制细菌 DNA 拓扑异构酶而发挥作用。其抗菌谱广，对革兰氏阳性菌(尤其是葡萄球菌和链球菌)、革兰氏阴性菌(大肠杆菌、沙门氏菌、变形杆菌、摩氏摩根菌、弗氏柠檬酸杆菌、阴沟肠杆菌、粘质沙雷氏菌、克雷伯杆菌、志贺氏菌、巴斯德氏菌、嗜血杆菌属、莫拉氏菌属、假单胞菌和犬布鲁氏菌)和支原体均有效。

药动学 按 2mg/kg 的剂量内服给药，马波沙星迅速被吸收，1.5 小时可达血药峰浓度，生物利用度为 88.94%，马波沙星与血浆蛋白的结合率很低(<10%)，广泛分布于整个机体。在大多数组织(肾、肝、皮肤、肺、膀胱和消化道)的浓度均高于血浆中的药物浓度。马波沙星在体内消除缓慢，犬的半衰期为 15h，主要以活性形式排出，2/3 从尿液排出，1/3 从粪便排出。

药物相互作用 (1) 同时内服铝、钙、铁、镁等金属阳离子可能会降低马波沙星的生物利用度。

(2) 与茶碱同时给药时需减少茶碱的使用剂量。

【作用与用途】氟喹诺酮类抗菌药。用于治疗由肺炎链球菌等敏感菌引起的犬呼吸道感染。

【用法与用量】内服：一次量，每 1kg 体重，犬 0.1 片，急性呼吸道感染连续用药 7 天，慢性呼吸道感染连续用药 21 天。

【不良反应】在治疗期间可能会出现轻度的呕吐，粪便软化，口渴和多动症状，停药后上述症状会消失。

【注意事项】(1) 本品适用于 1 岁以上的小型犬，1.5 岁以上的大型犬。

(2) 孕犬及哺乳犬慎用。

【休药期】不适用。

【规格】20mg

【包装】

【贮藏】遮光，密封，在干燥处保存。

【有效期】
【批准文号】
【生产企业】

马波沙星片质量标准（草案）

【作用与用途】氟喹诺酮类抗菌药。用于治疗由肺炎链球菌等敏感菌引起的犬呼吸道感染。

【用法与用量】以马波沙星计。内服：一次量，每 1kg 体重，犬 2mg，急性呼吸道感染连续用药 7 天，慢性呼吸道感染连续用药 21 天。

【不良反应】在治疗期间可能会出现轻度的呕吐，粪便软化，口渴和多动症状，停药后上述症状会消失。

【注意事项】(1) 本品适用于 1 岁以上的小型犬，1.5 岁以上的大型犬。
(2) 孕犬及哺乳犬慎用。

【休药期】不适用。

【规格】(1) 5mg (2) 20mg

【贮藏】遮光，密封，在干燥处保存。

备注：本标准替代农业部第 2324 公告和第 2412 号公告发布的同品种
质量标准和说明书。