

硫酸头孢喹肟乳房注入剂（泌乳期）说明书（草案）

【兽药名称】

通用名称：硫酸头孢喹肟乳房注入剂（泌乳期）

商品名称：

英文名称：Cefquinome Sulfate Intramammary Infusion (Lactating Cow)

汉语拼音：Liusuan Toubaokuiwo Rufang Zhuruji (Mirusi)

【主要成分】硫酸头孢喹肟

【性状】本品为类白色至浅褐色混悬液。

【药理作用】头孢喹肟是 β -内酰胺类抗生素。通过抑制细菌细胞壁的合成达到杀菌效果，具有广谱的抗菌活性，对青霉素酶与 β -内酰胺酶稳定。体外抑菌试验表明本品对葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌、化脓隐秘杆菌等奶牛乳房内感染常见病原菌均有较好的体外抑菌作用。

【作用与用途】 β -内酰胺类抗生素。用于治疗由敏感菌引起的奶牛泌乳期乳房炎。

【用法与用量】乳管内注入：泌乳期奶牛，挤奶后每个受感染乳室 1 支，间隔 12 小时一次，连用 3 次。

【不良反应】可能引起动物的过敏反应。

【注意事项】（1）对 β -内酰胺类抗生素过敏的动物禁止使用本品。

（2）对青霉素和头孢菌素类抗生素过敏者勿接触本品。

（3）使用前应充分摇匀。

（4）灌注后轻轻按摩使药物在乳池内均匀分散。

（5）若本品在环境温度低于 -20°C 的条件下存放超过 12 小时，应在室温条件下放置 20 分钟后再供临床使用。

（6）使用本品后，未对牛奶之外的肌肉等其他可食性组织中的兽药残留进行安全性考察，请谨慎食用。

【休药期】弃奶期 96 h。

【规格】按 $\text{C}_{23}\text{H}_{24}\text{N}_6\text{O}_5\text{S}_2$ 计算 8g:75mg

【包装】8g/支

【贮藏】密闭，在凉暗处保存。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

硫酸头孢喹肟乳房注入剂（泌乳期）质量标准（草案）

【作用与用途】β-内酰胺类抗生素。用于治疗由敏感菌引起的奶牛泌乳期乳房炎。

【用法与用量】乳管内注入：泌乳期奶牛，挤奶后每个受感染乳室 1 支，间隔 12 小时一次，连用 3 次。

【不良反应】可能引起动物的过敏反应。

【注意事项】（1）对 β-内酰胺类抗生素过敏的动物禁止使用本品。

（2）对青霉素和头孢菌素类抗生素过敏者勿接触本品。

（3）使用前应充分摇匀。

（4）灌注后轻轻按摩使药物在乳池内均匀分散。

（5）若本品在环境温度低于-20℃的条件下存放超过 12 小时，应在室温条件下放置 20 分钟后再供临床使用。

（6）使用本品后，未对牛奶之外的肌肉等其他可食性组织中的兽药残留进行安全性考察，请谨慎食用。

【休药期】弃奶期 96 h。

【规格】按 $C_{23}H_{24}N_6O_5S_2$ 计算 8g:75mg

【贮藏】密闭，在凉暗处保存。

备注：本标准替代农业部第 2059 公告、第 2159 公告、第 2192 公告和第 2195 号公告发布的同品种质量标准和说明书。