

## 硫酸头孢喹肟乳房注入剂（干乳期）说明书（草案）

### 【兽药名称】

通用名称：硫酸头孢喹肟乳房注入剂（干乳期）

商品名称：

英文名称：Cefquinome Sulfate Intramammary Infusion (Dry Cow)

汉语拼音：Liusuan Toubaokuiwo Rufang Zhuruji (Ganruqi)

### 【主要成分】硫酸头孢喹肟

【性状】本品为类白色至淡黄色混悬液；久置分层。

【药理作用】β-内酰胺类抗生素。通过抑制细菌细胞壁的合成达到杀菌效果，具有广谱的抗菌活性，对青霉素酶与β-内酰胺酶稳定。体外抑菌试验表明本品对葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌、化脓隐秘杆菌等奶牛乳房内感染常见病原菌均有较好的体外抑菌作用。

【作用与用途】β-内酰胺类抗生素。用于预防由金黄色葡萄球菌、停乳链球菌、乳房链球菌和大肠杆菌等细菌引起的奶牛干乳期乳房炎。

【用法与用量】乳管注入：干乳期奶牛，在最后一次挤奶后，每个乳室注入本品1支。

【不良反应】可能引起动物的过敏反应。

【注意事项】（1）仅用于干乳期奶牛。

（2）使用前将药液摇匀，一次性注入乳管中。

（3）对β-内酰胺类抗生素过敏的动物禁用，对此类药物有过敏反应者请避免直接接触此产品。

（4）给药前，乳汁要完全挤出，用干净的毛巾擦净乳头；给药后，轻轻按摩乳房，使药物完全扩散。

（5）置儿童无法触及处。

（6）鉴于未进行奶牛体内消除研究，建议肌肉及内脏慎食用。

【休药期】产犊前50天给药，弃奶期为产后1日。

【规格】按 $C_{23}H_{24}N_6O_5S_2$ 计算 3g: 0.15g

【包装】

【贮藏】密闭，在凉暗处保存。

【有效期】

【生产企业】

---

## 硫酸头孢喹肟乳房注入剂（干乳期）质量标准（草案）

【作用与用途】 $\beta$ -内酰胺类抗生素。用于预防由金黄色葡萄球菌、停乳链球菌、乳房链球菌和大肠杆菌等细菌引起的奶牛干乳期乳房炎。

【用法与用量】乳管注入：干乳期奶牛，在最后一次挤奶后，每个乳室注入本品 1 支。

【不良反应】可能引起动物的过敏反应。

【注意事项】（1）仅用于干乳期奶牛。

（2）使用前将药液摇匀，一次性注入乳管中。

（3）对  $\beta$ -内酰胺类抗生素过敏的动物禁用，对此类药物有过敏反应者请避免直接接触此产品。

（4）给药前，乳汁要完全挤出，用干净的毛巾擦净乳头；给药后，轻轻按摩乳房，使药物完全扩散。

（5）置儿童无法触及处。

（6）鉴于未进行奶牛体内消除研究，建议肌肉及内脏慎食用。

【休药期】产犊前 50 天给药，弃奶期为产后 1 日。

【规格】按  $C_{23}H_{24}N_6O_5S_2$  计算 3g: 0.15g

【贮藏】密闭，在凉暗处保存。

备注：本标准替代农业部第 2211 号公告、第 2226 号公告、第 2328 号公告和第 2341 号公告发布的同品种质量标准和说明书。