

氟苯尼考子宫注入剂说明书（草案）

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称：氟苯尼考子宫注入剂

商品名称：

英文名称：Florfenicol Intrauterine Infusion

汉语拼音：Fubennikao Zigongzhuruji

【主要成分】氟苯尼考

【性状】本品为无色至淡黄色液体。

【药理作用】氟苯尼考为酰胺醇类抗生素，通过与核糖体 50s 亚基结合抑制细菌蛋白质的合成而发挥作用。对多种革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌及支原体有较强的抗菌活性。

【作用与用途】酰胺醇类抗生素。用于敏感细菌所致牛的子宫内膜炎。

【用法与用量】子宫内灌注：一次量，牛 25ml（1 支），每 3 日 1 次，连用 2~4 次。

【不良反应】过量使用可引起奶牛短暂的厌食、饮水减少和腹泻，停药后几日即可恢复。

【注意事项】怀孕母牛禁用。

【休药期】牛 28 日；弃奶期 7 日。

【规格】25ml：2g

【包装】

【贮藏】密闭保存。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

氟苯尼考子宫注入剂质量标准（草案）

【作用与用途】酰胺醇类抗生素。用于敏感细菌所致牛的子宫内膜炎。

【用法与用量】子宫内灌注：一次量，牛 25ml（1 支），每 3 日 1 次，连用 2~4 次。

【不良反应】过量使用可引起奶牛短暂的厌食、饮水减少和腹泻，停药后几日即可恢复。

【注意事项】怀孕母牛禁用。

【休药期】牛 28 日；弃奶期 7 日。

【规格】25ml：2g

【贮藏】密闭保存。