

非泼罗尼喷雾剂说明书

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名：非泼罗尼喷雾剂

商品名：

英文名：Fipronil Spray

汉语拼音：FeiponuoliPenji

【主要成分】 非泼罗尼

【性状】 本品为无色或几乎无色澄清液体。

【药理作用】 药效学 非泼罗尼属苯吡唑类新型杀虫剂，药物与靶虫细胞上的特异性高亲合力的位点结合，影响了细胞膜对 Cl⁻的通透性，继而引起线虫的神经细胞及节肢动物的肌细胞抑制性神经递质 γ -氨基丁酸(GABA)的释放增加，打开谷氨酸控制的 Cl⁻通道，增强神经膜对 Cl⁻的通透性，增强神经膜对 Cl⁻ 的通透性，从而阻断神经信号的传递，最终神经麻痹，使肌肉细胞失去收缩能力，而导致虫体死亡。

【作用与用途】 用于驱杀犬外寄生虫如跳蚤和蜱。

【用法与用量】 外用喷雾，喷量为 0.5ml/喷次。根据犬被毛的长度和浓密度给药，短毛犬和长毛犬的给药剂量分别为每 1kg 体重 3ml 和 6ml，毛发中等浓密的犬在每 1kg 体重 3~6ml 剂量范围内给药，相当于每 1kg 体重使用本品 6~12 喷次，感染严重的犬可加倍剂量使用，每月一次。

操作方法：将动物置于通风良好的房间或室外，操作人员佩戴防水的一次性手套，待动物处于相对安静状态时，垂直持本品在距离动物约 10~20cm 处向其全身逆毛喷雾，给药部位包括犬左右两侧的前上肢、胸部、腹部、后肢至后脚掌；背部给药从颈部向后喷至腰部至尾巴；犬的腹面部位从下颌底部至胸部、腹部以及四肢的内侧面；眼部及头部给药时，先将药物喷在手套上，避开眼睛和嘴，轻轻涂抹在毛发上，直至毛发全部润湿。喷洒结束后揉搓被毛，确保全身被毛层全部湿润，药物覆盖全部的皮肤和被毛，自然风干，切勿用毛巾擦干。犬洗浴两天后使用本品，使用后 24 小时内避免洗澡可以达到最好的疗效。

根据犬的类型和体重，每只犬的具体喷次见下表：

体重(kg)	喷次		体重(kg)	喷次	
	短毛犬	长毛犬		短毛犬	长毛犬
1	6	12	9	56	108

2	12	24	10	60	120
3	18	36	11	66	132
4	24	48	12	72	144
5	30	60	13	78	156
6	36	72	14	84	168
7	42	84	15	90	180
8	48	96	16	96	192

【不良反应】犬不慎舔舐用药部位，会因制剂中赋形剂的作用出现短暂的流涎。此外，极少数患犬会在用药部位出现一过性皮肤过敏症状（脱屑、掉毛、瘙痒和红疹现象），极罕见敏感体质的犬使用后出现过敏、抑郁等神经症状或者呕吐和呼吸异常。发生如上情况应立即停止给药。

【注意事项】

(1)本品易燃，勿在热源和明火附近储存和使用，动物使用该药后 30 分钟内勿靠近明火。

(2)发烧、患有系统性疾病及处于恢复期的犬禁用，对杀虫剂和酒精过敏的犬及人避免接触本品。

(3)吞服和吸入本品有害，给药过程中请不要吸烟、进食及饮水，给药后请清洗双手及接触到药物的皮肤。

(4)本可导致皮肤和眼的轻微刺激，药物不慎到眼睛立即用水多次冲洗

(5)非泼罗尼可能会对水生动物产生毒性作用，禁止将用剩的药和容器丢弃到池塘、排水管道和水沟。

(6)放置于儿童触及不到的地方。

【休药期】

【规格】 100ml: 0.25g

【包装】

【贮藏】 遮光，在阴凉、干燥处保存。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

美洛昔康注射液说明书

兽用处方药

【兽药名称】

通用名：美洛昔康注射液

商品名：

英文名：Meloxicam Injection

汉语拼音：MeiluoXikang Zhusheye

【主要成分】 美洛昔康

【性状】 本品为黄色或黄绿色澄明液体。

【药理作用】 药效学 本品为解热镇痛非甾体抗炎药，主要通过抑制环氧酶（COX）的活性，减少前列腺素（PGs）的产生而发挥其镇痛作用。本品主要选择性地抑制环氧酶（COX-2），而对环氧酶 1（COX-1）的抑制作用较弱。因此，与其它同类药相比，本品对胃肠道或肾脏的不良反应较轻。

药动学 本品皮下注射给药后，在犬体内吸收迅速，达峰时间快，约 2.31 h 达到峰浓度，吸收完全（生物利用度 109.19%），血中平均滞留时间较长。美洛昔康主要是以原形代谢，代谢物主要从尿中和粪便排出。

【药物相互作用】 （1）与其他解热镇痛非甾体抗炎药合用时增加胃肠道溃疡及出血的危险性。

（2）内服抗凝剂、氨苄噻啶、肝素、溶栓药，可增加出血的可能。

（3）美洛昔康能增加氨甲蝶呤的血液毒性、环孢素的肾毒性。

（4）与血管紧张素转化酶抑制剂、噻嗪类利尿药合用可降低后者的降压和利尿作用。

【作用与用途】 用于治疗犬软组织及骨、关节损伤引起的疼痛，如股骨头切除术引发的骨及软组织损伤引起的疼痛、髋关节发育不良等引发的疼痛。

【用法与用量】 以美洛昔康计。皮下注射：每 1 kg 体重，犬首次量 0.2 mg，维持量 0.1 mg，一日 1 次，连用 7 日。

【不良反应】 食欲不振、呕吐、腹泻。通常是暂时性的，极少数引起死亡。

【注意事项】 1.不推荐用于妊娠期、泌乳期或不足 6 周龄的犬。

2.对本品过敏的犬忌用。

3.存在肾毒性的潜在风险，请慎用于脱水、血容量减少或低血压的动物。

4.胃肠道溃疡或出血，肝脏、心脏或肾脏功能受损及出血异常的犬忌用。

5.不得与糖皮质激素、其他非类固醇类消炎药或抗凝血剂合用。

6.对解热镇痛非甾体抗炎药过敏的人应避免直接接触本品。远离儿童。

【规格】 按 $C_{14}H_{13}N_3OS_2$ 计 (1) 2 ml : 4 mg (2) 20 ml : 40 mg (3) 1 ml : 5 mg (4) 5 ml : 25 mg (5) 50 ml : 250 mg

【包装】

【贮藏】 密闭保存。

【有效期】

复方阿莫西林粉说明书

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：复方阿莫西林粉

商品名称：

英文名称：Compound Amoxicillin Powder

汉语拼音：Fufang Amoxilin Fen

【主要成分】阿莫西林、克拉维酸钾

【性状】本品为白色或类白色粉末。

【药理作用】 药效学 阿莫西林具有广谱抗菌作用。抗菌谱及抗菌活性与氨苄西林基本相同，对大多数革兰氏阳性菌的抗菌活性稍弱于青霉素，对 β -内酰胺酶敏感，故对产 β -内酰胺酶的金黄色葡萄球菌无效。对革兰氏阴性菌如大肠埃希菌、变形杆菌、沙门氏菌、嗜血杆菌、布鲁氏菌和巴氏杆菌等有较强的作用，但这些细菌易产生耐药性。克拉维酸可与多种耐药菌产生的 β -内酰胺酶

不可逆结合，避免阿莫西林被破坏，充分发挥其抗菌功效。

药动学 阿莫西林对胃酸相当稳定，单胃动物内服后 74%~92% 吸收。由于阿莫西林在单胃动物的吸收比氨苄西林好，血药浓度较高，故对全身性感染的疗效较好。

【药物相互作用】 (1) 本品与氨基糖苷类合用，可提高后者在菌体内的浓度，呈现协同作用。

(2) 大环内酯类、四环素类和酰胺醇类等速效抑菌剂对本品的杀菌作用有干扰作用，不宜合用。

【作用与用途】 β -内酰胺类抗生素。用于鸡敏感菌引起的感染。

【用法与用量】 以本品计。混饮：每 1 L 水，鸡 0.5 g。一日 2 次，连用 3~7 日。

【不良反应】 对胃肠道正常菌群有较强的干扰作用。。

【注意事项】 (1) 产蛋供人食用的鸡，在产蛋期不得使用。

(2) 本品水溶液不稳定，现用现配。

(3) 对 β -内酰胺类抗生素过敏者应避免直接接触此产品。

【休药期】 鸡 7 日。

【规格】 50 g：阿莫西林 5g+克拉维酸 1.25g

【包装】

【贮藏】 遮光，密封，在凉暗处保存。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

盐酸多西环素可溶性粉说明书

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：盐酸多西环素可溶性粉

商品名称：

英文名称：Doxycycline Hyclate Soluble Powder

汉语拼音：Yansuan Duoxihuansu Kerongxingfen

【主要成分】盐酸多西环素。

【性状】本品为淡黄色或黄色结晶性粉末。

【药理作用】药效学 多西环素具有广谱抑菌作用，敏感菌包括肺炎球菌、链球菌、部分葡萄球菌、炭疽杆菌、破伤风杆菌、棒状杆菌等革兰阳性菌以及大肠埃希菌、巴氏杆菌、沙门氏菌、布鲁氏菌、嗜血杆菌、克雷伯菌、鼻疽杆菌等革兰阴性菌。对立克次体、支原体（如猪肺炎支原体）、螺旋体等也有一定的抑制作用。多西环素通过可逆性地与细菌核糖体 30S 亚基结合，干扰 tRNA 与 mRNA 形成核糖体复合物，阻止肽链延长而抑制蛋白质合成，从而使细菌的生长繁殖迅速被抑制。多西环素对革兰阳性菌和阴性菌均有抑制作用。

药动学 内服吸收迅速，受食物影响较小，生物利用度较高，组织渗透力强，分布广泛，有效血药浓度维持时间长。猪体内蛋白结合率为 93%。

【药物相互作用】（1）与碳酸氢钠同服，可升高胃内 pH，使本品的吸收减少及活性降低。

（2）本品能与二、三价阳离子形成复合物，因而当它们与钙、镁、铝等抗酸药、含铁的药物同饲时会减少其吸收，造成血药浓度降低。

（3）与强利尿药如呋塞米等同用可使肾功能损害加重。

（4）可干扰青霉素类对细菌繁殖期的杀菌作用，宜避免同用。

【作用与用途】四环素类抗生素。用于治疗猪、鸡革兰氏阳性菌、阴性菌引起的大肠埃希菌病、沙门氏菌病、巴氏杆菌病以及支原体引起的呼吸道疾病。

【用法与用量】以本品计。混饮：每 1L 水，猪 0.5~1g；鸡 6g。连用 3~5 日。

【不良反应】长期应用可引起二重感染和肝脏损害。

【注意事项】（1）产蛋供人食用的鸡，在产蛋期不得使用。

（2）避免与含钙量较高的饲料同时饲用。

【休药期】猪 12 日，鸡 12 日。

【规格】5%

【包装】

【贮藏】 密封，遮光，干燥处保存。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

多拉菌素注射液说明书

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：多拉菌素注射液

商品名称：

英文名称：Doramectin Injection

汉语拼音：Duolajunsu Zhusheye

【主要成分】多拉菌素

【性 状】无色或微黄色澄明油状液体。

【药理作用】多拉菌素是由基因重组的阿维链霉素（*Streptomyce avermitilis*）新菌株发酵而得，是广谱抗寄生虫药。对体内外寄生虫特别是某些线虫（圆虫）和节肢动物具有良好的驱杀作用，但对绦虫、吸虫及原生动物无效。其作用机制主要是增加虫体的抑制性递质 γ -氨基丁酸（GABA）的释放，从而阻断神经信号的传递，使肌肉细胞失去收缩能力，而导致虫体死亡。哺乳动物的外周神经递质为乙酰胆碱，不会受到多拉菌素的影响。多拉菌素不易透过血脑屏障，对中枢神经系统损害极小，对牲畜比较安全。

【作用与用途】大环内酯类抗寄生虫类药。用于治疗家畜线虫病、血虱、螨病等外寄生虫病。

【用法与用量】肌内注射：一次量，每 10kg 体重，猪 0.3ml。

【不良反应】按推荐剂量使用，尚未见不良反应。

【注意事项】（1）将本品置于儿童接触不到的地方。

（2）使用本品时操作人员不应进食或吸烟，操作后要洗手。

(3) 其残存药物对鱼类及水生生物有毒，应注意保护水资源。

【休药期】猪 56 日。

【规格】(1) 50ml:0.5g (2) 100ml:1g

【包装】

【贮藏】遮光，密闭保存。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

替米考星可溶性粉说明书

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：替米考星可溶性粉

商品名称：

英文名称：Tilmicosin Soluble Powder

汉语拼音：Timikaoxing Kerongxingfen

【主要成分】替米考星

【性状】本品为类白色粉末。

【药理作用】 药效学 替米考星属动物专用半合成大环内酯类抗生素。对支原体较强，抗菌作用与泰乐菌素相似，敏感的革兰氏阳性菌有金黄色葡萄球菌（包括耐青霉素金黄色葡萄球菌）、肺炎球菌、链球菌、李斯特菌、腐败梭菌等。敏感的革兰氏阴性菌有嗜血杆菌、脑膜炎双球菌、巴氏杆菌等。对胸膜肺炎放线杆菌、巴氏杆菌及禽支原体的活性比泰乐菌素强。95%的溶血性巴氏杆菌菌株对本品敏感。

药动学 内服后吸收迅速，特点是组织穿透力强，分布容积大(大于 2 L/kg)。肺中浓度高，消除半衰期可达 1~2 天，有效血药浓度维持时间长。

【药物相互作用】 (1) 与其他大环内酯类、林可胺类的作用靶点相同，不宜同时使用。

(2) 与 β -内酰胺类合用表现为拮抗作用。

【作用与用途】 大环内酯类抗生素。用于鸡支原体、巴氏杆菌感染。

【用法与用量】 以本品计。混饮：每 1L 水，鸡 0.75g。连用 3 日。

【不良反应】 本品对动物的毒性作用主要是心血管系统，可引起心动过速和收缩力减弱。

【注意事项】 产蛋供人食用的鸡，在产蛋期不得使用。

【休药期】 鸡 10 日。

【规格】 10%

【包装】

【贮藏】 遮光，密闭，在干燥处保存。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】