

狂犬病灭活疫苗

Kuangquanbing Miehuoyimiao

Rabies Vaccine, Inactivated

本品系用狂犬病病毒接种敏感细胞系培养，收获培养物，用适宜灭活剂灭活后，加适宜佐剂制成。用于预防犬、猫等动物狂犬病。

【性状】 本品静置后，上层为澄清液体，下层有少量沉淀，振摇后沉淀可均匀分散。

【装量检查】 按附录 3104 进行检查，应符合规定。

【无菌检验】 按附录 3306 进行检查，应无菌生长。

【灭活检验】 取至少 5 头份疫苗，混匀，用体重 11~13g 小鼠 10 只，各脑内接种疫苗 0.03ml，观察 21 日，应不出现任何狂犬病症状或由疫苗引起的不良反应。若接种 48 小时内死亡的小鼠超过 2 只，则应重检。

【安全检验】 用 2~3 月龄健康易感（狂犬病抗体阴性）犬 3 只，各皮下或肌肉接种疫苗 2.0 ml，观察 21 日，应全部健活，且不出现局部或全身不了反应。

【效力检验】 按附录 3407 进行测定，每头份疫苗应至少含 2 个国际单位（2.0 IU）。

【作用与用途】 用于预防犬、猫等动物狂犬病。免疫期为 12 个月。

【用法与用量】 肌肉或皮下注射。首次免疫每只注射 1ml，免疫后 2~3 周，以相同剂量加强免疫 1；以后每年免疫 1 次。

【注意事项】 （1）仅用于健康动物。

（2）注射后可能出现过敏反应或出现注射肢的一过性跛行。

（3）切忌冻结，冻结的疫苗严禁使用。

（4）使用前，应先使疫苗恢复至室温，并充分摇匀。

（5）接种时，应作局部消毒处理。

（6）注苗后应注意观察，如出现过敏反应，应及时注射抗过敏药物。

（7）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】 （1）1 ml/瓶 （2）2ml/瓶 （3）5 ml/瓶 （4）10ml/瓶

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为 12 个月。

备注：本标准为中国兽药典委员会新拟定标准。