

# 保胎无忧散

Baotai Wuyou San

【处方】 当归 50g      川芎 20g      熟地黄 50g      白芍 30g  
         黄芪 30g      党参 40g      白术（炒焦）60g      枳壳 30g  
         陈皮 30g      黄芩 30g      紫苏梗 30g      艾叶 20g  
         甘草 20g

【制法】 以上 13 味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为淡黄色的粉末；气香，味甘、微苦。

【鉴别】（1）取本品，置显微镜下观察：薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。联结乳管直径 12~15 $\mu$ m，含细小颗粒状物。草酸钙针晶细小，长 10~32 $\mu$ m，不规则地充塞于薄壁细胞中。纤维成束或散离，壁厚，表面有纵裂纹，两端断裂成帚状或较平截。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。草酸钙簇晶直径 18~32 $\mu$ m，存在于薄壁细胞中，常排列成行或一个细胞中含有数个簇晶。T 字形毛弯曲，柄 2~4 细胞。

（2）取本品 5g，加乙醚 50ml，超声处理 10 分钟，滤过，滤液挥干，残渣加乙酸乙酯 1 ml 使溶解，作为供试品溶液。另取当归对照药材 0.5g、川芎对照药材 0.25g，分别加乙醚 15ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录 0502）试验，吸取上述三种溶液各 5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯（9：1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

（3）取本品 ~~4g~~7.5g，~~加石油醚（60~90℃）15 ml，超声处理 30 分钟，~~加正己烷 20ml，~~超声处理 15 分钟，~~滤过，滤液~~挥干，残渣加石油醚（60~90℃）3 ml 使溶解，~~作为供试品溶液。另取白术对照药材 0.5g，~~加石油醚（60~90℃）5 ml，~~加正己烷 5ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录 0502）试验，吸取上述~~两种溶液各 5 $\mu$ l，~~新制备的供试品溶液 10 $\mu$ l、对照药材溶液 5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 ~~H~~G 薄层板上，以石油醚（60~90℃）-乙酸乙酯（~~50:1~~~~100:2~~）为展开剂，展开，取出，晾干。喷以 5%~~对二甲氨基苯甲醛的 10% 香草醛~~硫酸溶液，~~在 100~60℃~~加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，~~显相同的桃红色主斑点（苍术酮）~~应显有一桃红色主斑点（苍术酮）。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 0101）。

【功能】 养血，补气，安胎。

【主治】 胎动不安。

【用法与用量】 马、牛 200~300 g；羊、猪 30~60 g。

【贮藏】 密闭，防潮。