

催情散

Cuiqing San

【处方】 淫羊藿 6g 阳起石（酒淬） 6g 当归 4g 香附 5g
益母草 6g 菟丝子 5g

【制法】 以上 6 味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为淡灰色的粉末；气香，味微苦、微辛。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：非腺毛 3~10 细胞，长 200~1000 μm ，顶端细胞长，有的含棕色或黄棕色物。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物，周围细胞作放射状排列。非腺毛 1~3 细胞，稍弯曲，壁有疣状突起。种皮栅状细胞 2 列，内列较外列长，有光辉带。

(2) 取本品 3.2g，加乙醇 20ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取淫羊藿苷对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 0502）试验，吸取上述两种溶液各 4 μl ，分别点于同一硅胶 H 薄层板上，以乙酸乙酯-丁酮-甲酸-水（10:1:1:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，放置 30 分钟后，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

(3) 取本品 4g，加乙醚 20ml，超声处理 10 分钟，滤过，滤液挥干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取当归对照药材 0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μl ，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯（4:1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 0101)。

【功能】 催情。

【主治】 不发情。

【用法与用量】 猪 30~60g。

【贮藏】 密闭，防潮。