

鸡痢灵片

Jililing Pian

【处方】 雄黄10g 藿香10g 白头翁15g 滑石10g
马尾连15g 诃子15g 马齿苋15g 黄柏10g

【制法】 以上8味，除雄黄、滑石另研成细粉外，其余6味粉碎成细粉，过筛，余渣煎煮滤过，滤液浓缩，加入以上细粉，混匀，制粒，干燥，压制成400片，即得。

【性状】 本品为棕黄色片；气微，味苦、涩。

【鉴别】（1）取本品，置显微镜下观察：不规则碎块金黄色或橙黄色，有光泽。非腺毛1~4细胞，壁有疣状突起。非腺毛单细胞，直径13~33 μ m，基部稍膨大，壁大多木化，有的可见螺状或双螺状纹理。草酸钙簇晶直径7~37 μ m，存在于叶肉组织中。纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚。果皮纤维层淡黄色，斜向交错排列，壁较薄，有纹孔。不规则块片无色，有层层剥落痕迹。

（2）取本品研细的粉末0.2g，加水湿润后加氯酸钾饱和的硝酸溶液2ml，振摇，滤过，滤液加10%氯化钡溶液，生成白色沉淀。放置后，倾出上层酸液，再加水2ml，振摇，沉淀不溶解。

（3）取本品研细的粉末 1g，加甲醇 10ml，~~加热回流 15~~ **超声处理 20** 分钟，滤过，~~取滤液~~ **作为供试品溶液**。另取盐酸小檗碱对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以 ~~苯环己烷~~ **苯环己烷**-乙酸乙酯-甲醇-异丙醇-~~浓氨试液水~~ **三乙胺**（~~6+3+1.5+1.5+0.5~~ **3:3.5:1:1.5:0.5:1**）为展开剂，置氨蒸气饱和的展开缸内，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的一个黄色荧光斑点。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（附录0103）。

【功能】 清热解毒，涩肠止痢。

【主治】 雏鸡白痢。

【用法与用量】 雏鸡2片。

【规格】 每1片相当于原生药0.25 g。

【贮藏】 密闭，防潮。