

益母生化散

Yimu Shenghua San

【处方】 益母草 120g 当归 75g 川芎 30g 桃仁 30g
 炮姜 15g 炙甘草 15g

【制法】 以上6味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为黄绿色至黄棕色的粉末；气清香，味甘、微苦。

【鉴别】 （1）取本品，置显微镜下观察：纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。螺纹导管直径8~23 μm，加厚壁互相连接，似网状螺纹导管。非腺毛1~3细胞，稍弯曲，壁有疣状突起。淀粉粒长卵形、广卵形或形状不规则，有的较小端略尖凸，直径25~32 μm，长约至50 μm，脐点点状，位于较小端。

（2）取本品2.5 g，加乙醚20 ml，超声处理10分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇2 ml使溶解，作为供试品溶液。另取益母草对照药材1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录0502）试验，吸取上述两种溶液各5 μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯（8：3）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365 nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

（3）取本品2 g，加乙醚20 ml，超声处理10分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇2 ml使溶解，作为供试品溶液。另取当归对照药材0.5 g和川芎对照药材0.2 g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录0502）试验，吸取上述三种溶液各10 μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯（4：1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365 nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录0101）。

【功能】 活血祛瘀，温经止痛。

【主治】 产后恶露不行，血瘀腹痛。

【用法与用量】 马、牛250~350g；羊、猪30~60g。

【贮藏】 密闭，防潮。