

酢浆草

Cujiangcao

OXALIS CORNICULATAE HERBA

本品为酢浆草科植物酢浆草 *Oxalis corniculata* L. 的干燥全草。全年均可采收，除去泥沙、杂质，鲜用或晒干。

【性状】 本品茎细而柔弱，节上生不定根。三出复叶，互生，叶柄细长，被柔毛；小叶无柄，倒心形，长 0.5~1cm，被柔毛。花 1 至数朵组成腋生的伞形花序，总花梗与叶柄等长；花黄色，长 0.8~1cm。蒴果近圆柱形，长 1~1.5cm，有 5 棱，被短柔毛。

【鉴别】 本品粉末灰褐色。非腺毛众多，单细胞，表面有疣点突起，直径 18~75 μ m，长可达 2200 μ m。螺纹导管直径 11~60 μ m。草酸钙方晶多见，成片散布于薄壁组织中，直径 15~35 μ m，草酸钙簇晶直径 26~170 μ m。

【检查】 水分 不得过 13.5%(附录 0832 第一法)。

总灰分 不得过 20.0%(附录 2302)。

酸不溶性灰分 不得过 10.0%(附录 2302)。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法(附录 2201)项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 15.0%。

饮片

【炮制】 除去残根及杂质，洗净，切段，干燥。

【性味与归经】 酸，微寒。归胃、小肠经。

【功能】 清热利湿，解毒消肿。

【主治】 外感发热，膀胱湿热，痢疾；外治跌打损伤，痈肿疮毒，湿疹，烫火伤。

【用法与用量】 马、牛 120~180g；羊、猪 30~60g。

外用适量，多取鲜品捣烂敷患处。

【注意】 孕畜慎用。

【贮藏】 置通风干燥处。