

附件 2 略

附件 3 略

附件 4

说明书和标签

一、注射用促卵泡素说明书和标签

(一) 注射用促卵泡素说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：注射用促卵泡素

商品名称：扶托平

英文名称：Follicle Stimulating Hormone for Injection

汉语拼音：Zhusheyong Culuanpaosu

【主要成分】 促卵泡素

【性状】 本品为类白色至米黄色冻干饼（粉）至棕色结晶物，可能略带粉色。

【药理作用】 激素类药。促卵泡素（FSH）具有促进卵泡成熟和排卵作用。能够增加母牛的排卵数量，诱导母牛超数排卵。

【适应证】 用于诱导成年母牛超数排卵。

【用法与用量】 以本品计。肌肉注射：一次量，牛2.5ml（相当于促卵泡素87.5单位），一日2次，连用4日。临用前以稀释液（抑菌氯化钠注射液20ml）稀释。

【不良反应】 按推荐的用法与用量使用，未见不良反应。

【注意事项】 使用前，在无菌条件下，用稀释液复溶本品，该溶液在2~7℃保存，不超过5日。

【休药期】 无需制定。

【规格】 700单位促卵泡素+20ml稀释液（抑菌氯化钠注射液）

【包装】 注射用促卵泡素1瓶/盒，稀释液1瓶/盒。

【贮藏】 遮光，密闭，室温保存。

【有效期】 48个月

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 威隆制药（北美）有限公司（Vetoquinol N.-A. Inc.）

【生产厂名称】 吉友联霍利斯特斯蒂尔普通合伙公司（Jubilant HollisterStier General Partnership）

地址：16751 Trans-Canada Hwy, Kirkland, Quebec, Canada

(二) 注射用促卵泡素标签

兽用

【兽药名称】

通用名称：注射用促卵泡素

商品名称：扶托平

英文名称: Follicle Stimulating Hormone for Injection

汉语拼音: Zhushheyong Culuanpaosu

【主要成分】 促卵泡素

【性状】 本品为类白色至米黄色冻干饼（粉）至棕色结晶物，可能略带粉色。

【适应证】 用于诱导成年母牛超数排卵。

【用法与用量】 以本品计。肌肉注射：一次量，牛2.5ml（相当于促卵泡素87.5单位），一日2次，连用4日。临用前以稀释液（抑菌氯化钠注射液20ml）稀释。

【规格】 700单位促卵泡素+20ml稀释液（抑菌氯化钠注射液）

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【休药期】 无需制定。

【包装】 注射用促卵泡素1瓶/盒，稀释液1瓶/盒。

【贮藏】 遮光，密闭，室温保存。

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 威隆制药（北美）有限公司（Vetoquinol N.-A. Inc.）

【生产厂名称】 吉友联霍利斯特斯蒂尔普通合伙公司（Jubilant HollisterStier General Partnership）

地址：16751 Trans-Canada Hwy, Kirkland, Quebec, Canada

二、枸橼酸马罗匹坦注射液说明书和标签

（一）枸橼酸马罗匹坦注射液说明书

宠物用

【兽药名称】

通用名称：枸橼酸马罗匹坦注射液

商品名称：赛瑞宁

英文名称：Maropitant Citrate Injection

汉语拼音：Juyuansuan Maluopitan Zhusheye

【主要成分】 枸橼酸马罗匹坦

【性状】 本品为无色至淡黄色澄明液体。

【药理作用】 药理学 马罗匹坦为神经激肽（NK1）受体拮抗剂。呕吐是呕吐中枢的一种复杂调节过程，呕吐中枢接收和整合来自中枢神经刺激、外周神经刺激以及血液循环和脑脊液中化学物质刺激而产生呕吐反应。P物质为一类与呕吐有关的关键神经递质，阻断P物质与受体间的结合可有效抑制中枢神经性呕吐、外周神经性呕吐以及化学因素引起的呕吐。马罗匹坦能阻断中枢神经系统中的P物质与受体结合，起到止吐作用。

药动学 以1mg/kg剂量给予犬单次皮下注射，绝对生物利用度为90.7%，血浆蛋白结合率大于99%。45分钟内血药浓度可达峰值，血药峰浓度（C_{max}）为92μg/L，表观分布容积为9.3L/kg，半衰期（t_{1/2}）为8.84小时。临床试验显示，注射后1小时可达有效药物浓度，药效可持续24小时。马罗匹坦主要通过肝脏代谢，犬代谢马罗匹坦的肝药酶为CYP2D15和CYP3A12。马罗匹坦及其代谢物经肾脏的清除率小于1%。

以1mg/kg剂量给予猫单次皮下注射，绝对生物利用度为91.3%，血浆蛋白结合率约为

99.1%。平均 19 分钟血药浓度可达峰，血药峰浓度 (C_{max}) 为 165 μ g/L，半衰期 ($t_{1/2}$) 为 16.8 小时。临床研究显示，注射后 1 小时可达有效药物浓度，药效可持续 24 小时。马罗匹坦主要通过肝脏代谢，猫代谢马罗匹坦的肝药酶为 CYP1A 和 CYP3A。马罗匹坦原形经肾脏和粪便排泄小于 1%，马罗匹坦主要代谢产物经尿液和粪便排泄分别为 10.4%和 9.3%。

【适应证】 用于预防和治疗犬使用化疗药物引起的呕吐；预防除晕动性呕吐以外的呕吐；与其他支持疗法合用治疗呕吐。

用于预防猫除晕动性呕吐以外的呕吐；缓解恶心；与其他支持疗法合用治疗呕吐。

【用法与用量】 以马罗匹坦计。皮下注射：8 周龄及以上犬、16 周龄及以上猫，一次量，每 1kg 体重 1.0mg，一日 1 次，最多连用 5 日。

【不良反应】 1.本品推荐剂量可引起犬腹泻（7.8%）、厌食（5.2%）、注射部位肿胀或疼痛（4.0%）；罕见（ $1/10000 < \text{发生率} < 1/1000$ ）嗜睡、血尿、抓挠等；犬极罕见（发生率 $< 1/10000$ ）发生过敏反应，如过敏性水肿、荨麻疹、红斑、虚脱、呼吸困难和黏膜苍白等。治疗期间犬可能出现大量流涎。高剂量使用时上述多种不良反应可同时发生，但程度均较轻，且停药后不良反应症状会逐渐消失。小于 11 周龄的犬，可增加骨髓细胞减少症的发生率。

2.约 1/3 猫皮下注射时可能发生注射部位疼痛，为中度至重度疼痛反应。猫极罕见（发生率 $< 1/10000$ ）发生过敏反应，如过敏性水肿、荨麻疹、红斑、虚脱、呼吸困难、黏膜苍白等。

【注意事项】 1.用于预防呕吐时，犬猫应提前 1 小时以上注射本品。犬用于预防化疗药物引起的呕吐时，建议在犬使用化疗药物之前给予本品，预防呕吐作用更佳。

2.呕吐可能是某些严重疾病（如肠梗阻）的伴随症状，犬猫应明确诊断后使用本品。

3.肝功能障碍的犬猫慎用。

4.未在低于 8 周龄犬、低于 16 周龄猫、以及妊娠或哺乳期母犬及母猫中确立本品的安全性，如果使用，需通过兽医进行风险/收益评估。

5.马罗匹坦对钙和钾离子通道有亲和性，患有心脏疾病的犬猫慎用，且不能与钙离子通道拮抗剂合用。

6.由于犬猫在皮下注射时经常发生短暂疼痛，可采用适当的动物保定措施。注射冷藏温度的本品可减少注射时的疼痛反应。

7.马罗匹坦与犬猫血浆蛋白的结合率高达 99%，可能会与其他高血浆蛋白结合率药物存在竞争。

8.未进行本品与其他兽药的相容性研究，不得将本产品与其他兽药产品在同一注射器内混用。

9.不同年龄的猫对马罗匹坦的体内药代动力学不同，幼猫对马罗匹坦的体内清除率高于成年猫。

10.置于儿童不可触及处。

11.施药者接触本品可能会引起皮肤局部过敏反应，长期或多次接触药物也可导致皮肤过敏反应，使用时做好防护，意外接触本品时可用肥皂水或清水清洗。

12.本品对眼睛具有刺激性，施药者眼睛如意外接触本品，用清水冲洗 15 分钟并就医。

【休药期】 无需制定。

【规格】 以 $C_{32}H_{40}N_2O$ 计 20ml：0.2g

【包装】

【贮藏】 密闭保存。

【有效期】 36 个月；开启后 28 日。

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 硕腾公司（Zoetis Inc.）

【生产厂名称】 硕腾公司西班牙赫罗纳生产厂（Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.）

地址：Ctra. De Camprodon, s/n, Finca La Riba, Vall de Bianya, 17813 Gerona Espana

（二）枸橼酸马罗匹坦注射液标签

宠物用

【兽药名称】

通用名称：枸橼酸马罗匹坦注射液

商品名称：赛瑞宁

英文名称：Maropitant Citrate Injection

汉语拼音：Juyuansuan Maluopitan Zhusheye

【主要成分】 枸橼酸马罗匹坦

【性状】 本品为无色至淡黄色澄明液体。

【适应证】 用于预防和治疗犬使用化疗药物引起的呕吐；预防除晕动性呕吐以外的呕吐；与其他支持疗法合用治疗呕吐。

用于预防猫除晕动性呕吐以外的呕吐；缓解恶心；与其他支持疗法合用治疗呕吐。

【用法与用量】 以马罗匹坦计。皮下注射：8 周龄及以上犬、16 周龄及以上猫，一次量，每 1kg 体重 1.0mg，一日 1 次，最多连用 5 日。

【规格】 以 $C_{32}H_{40}N_2O$ 计 20ml：0.2g

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 无需制定。

【包装】

【贮藏】 密闭保存。

【企业名称】 硕腾公司（Zoetis Inc.）

【生产厂名称】 硕腾公司西班牙赫罗纳生产厂（Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.）

地址：Ctra. De Camprodon, s/n, Finca La Riba, Vall de Bianya, 17813 Gerona Espana

三、非泼罗尼吡丙醚滴剂（猫用）说明书和标签

（一）非泼罗尼吡丙醚滴剂（猫用）说明书

宠物用 外用药

【兽药名称】

通用名称：非泼罗尼吡丙醚滴剂（猫用）

商品名称：爱普多

英文名称：Fipronil and Pyriproxyfen Spot - on Solution（for cats）

汉语拼音：Feipoluoni Bibingmi Diji（Maoyong）

【主要成分】 非泼罗尼、吡丙醚

【性状】 本品为无色至淡黄色澄清液体。

【药理作用】 药效学 非泼罗尼是一种对多种害虫具有防治效果的苯吡唑类广谱杀虫药。与昆虫中枢神经细胞膜上的 γ -氨基丁酸（GABA）受体结合，关闭神经细胞的氯离子通道，从而干扰中枢神经系统的正常功能而导致昆虫死亡。吡丙醚是一种昆虫生长调节剂（IGR），属于保幼激素类似物。能杀灭虫卵、幼虫、蛹及成蚤，并控制动物所到之处环境中跳蚤的感染。

药动学 本品按推荐剂量给药后，非泼罗尼和吡丙醚可很好的分布在毛发中，84 日非泼罗尼浓度至少为 100ng/g，吡丙醚浓度至少为 50ng/g。给药后 1 日非泼罗尼达最高血药浓度，给药后 3 日和 1 日非泼罗尼和其主要代谢产物非泼罗尼砒化物的血药浓度至少为 1ng/ml。给药后 1 日吡丙醚达最高血药浓度，且给药后 42 日吡丙醚的血药浓度仍可检测到至少为 0.2ng/ml。

【适应证】 用于治疗 and 预防猫体表的跳蚤（猫栉首蚤）和治疗蜱虫（图兰扇头蜱、篦子硬蜱）感染。

跳蚤感染：使用一次有效性可持续 5 周。同时预防未来 12 周内跳蚤卵发育为成虫，从而预防跳蚤增殖。

蜱虫感染：使用一次有效性可持续 1 周。

【用法与用量】 外用。将猫颈部背侧的被毛拨开，暴露皮肤。将药液均匀滴于皮肤 1~2 点处。每次 1 支，按表 1 选择不同体积的滴管。如需重复用药，可以一个月为周期再次进行治疗。

表 1 非泼罗尼吡丙醚滴剂（猫用）用法与用量表

猫体重	滴管规格
1~6kg	0.5ml
6~12kg	2 支 0.5ml 滴管*

*对于体重超过 6kg 的猫可给予两支 0.5ml 装滴管。

【不良反应】 使用本品后，可能在用药部位观察到短暂的皮肤反应（鳞屑、局部脱发、瘙痒、红斑、皮肤变色）和全身瘙痒或脱毛。在极少数情况下，可能出现唾液分泌增多，可逆性神经症状（过度敏感、抑郁、焦虑症状），呼吸系统症状或呕吐。

【注意事项】 1. 本品非内服产品，仅供外用。用药前对猫称重，避免用药过量。

2. 10 周龄以下和/或体重不足 1kg 及生病或虚弱的猫慎用。

3. 本品不得用于兔。

4. 非泼罗尼和吡丙醚的实验室研究未显示致畸性或胚胎毒性作用，但未对猫进行致畸研究，妊娠和哺乳期猫应经兽医风险/获益评估后使用本品。

5. 对本品活性成分或辅料过敏的猫不得使用。

6. 在缺乏额外的安全性数据下，4 周内不得重复用药。

7. 该产品不能防止蜱虫附着动物，无法完全排除蜱虫传播疾病的风险。用药后 48 小时内可杀死蜱虫。如果用药前已感染蜱虫，那么对蜱虫的清除可能会超过 48 小时。

8. 蜱虫一旦死亡，通常会从猫身体上掉落。未掉落的死亡蜱虫需小心剔除，确保蜱虫完全取出。

9. 避免用药期间沐浴动物，从而保证用药期间的药效。偶尔少量淋水对治疗跳蚤及跳蚤卵发育没有影响，对蜱虫的治疗效果是否有影响尚未研究。

10. 用药期间为减少再次感染，应使用合适的杀虫剂对猫的篮子、被褥和常规休息区，

如地毯和玩具进行驱杀。为减少生活环境中其他跳蚤的影响，所有生活在同一家庭的动物也应使用合适的跳蚤控制产品进行驱杀。

11.用于猫干燥皮肤区域，避免舔舐及动物间互相舔舐。避免新用药的猫与其他动物玩耍或同寝。

12.避免动物眼睛和嘴接触本品。如接触，应立刻用水冲洗。避免在伤口及皮肤破损处使用。

13.待用药位点干燥后再与猫接触。新用药的猫不得和主人同寝。

14.本品可能对水体产生影响，用药后 2 日内禁止猫游泳。已用或未用完的产品应进行无害化处理。

15.给药者应注意，避免误食、手口接触，给药期间严禁吸烟和饮水或饮食，用药结束后洗手。一旦误食，请携带本品说明书和包装即时就诊。

16.置于儿童接触不到的地方。

【休药期】 无需制定。

【规格】 0.5ml：非泼罗尼 50mg+吡丙醚 60mg

【包装】 1 支/盒，2 支/盒，4 支/盒，24 支/盒和 60 支/盒。

【贮藏】 30℃以下，遮光、干燥处保存。

【有效期】 36 个月；滴管开启后立即使用。

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 法国维克有限公司（VIRBAC）

【生产厂名称】 法国维克有限公司（VIRBAC）

地址：1ERE AVENUE 2065 M L I D, 06516 CARROS, FRANCE

（二）非泼罗尼吡丙醚滴剂（猫用）标签

宠物用 外用药

【兽药名称】

通用名称：非泼罗尼吡丙醚滴剂（猫用）

商品名称：爱普多

英文名称：Fipronil and Pyriproxyfen Spot - on Solution（for cats）

汉语拼音：Feipoluoni Bibingmi Diji（Maoyong）

【主要成分】 非泼罗尼、吡丙醚

【性状】 本品为无色至淡黄色澄清液体。

【适应证】 用于治疗 and 预防猫体表的跳蚤（猫栉首蚤）和治疗蜱虫（图兰扇头蜱、篦子硬蜱）感染。

跳蚤感染：使用一次有效性可持续 5 周。同时预防未来 12 周内跳蚤卵发育为成虫，从而预防跳蚤增殖。

蜱虫感染：使用一次有效性可持续 1 周。

【用法与用量】 外用。将猫颈部背侧的被毛拨开，暴露皮肤。将药液均匀滴于皮肤 1~2 点处。每次 1 支，按表 1 选择不同体积的滴管。如需重复用药，可以一个月为周期再次进行治疗。

表 1 非泼罗尼吡丙醚滴剂（猫用）用法与用量表

猫体重	滴管规格
1~6kg	0.5ml
6~12kg	2 支 0.5ml 滴管*

*对于体重超过 6kg 的猫可给予两支 0.5ml 装滴管。

【规格】 0.5ml：非泼罗尼 50mg+吡丙醚 60mg

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【休药期】 无需制定。

【贮藏】 30℃以下，遮光、干燥处保存。

【包装】 1 支/盒，2 支/盒，4 支/盒，24 支/盒和 60 支/盒。

【企业名称】 法国维克有限公司（VIRBAC）

【生产厂名称】 法国维克有限公司（VIRBAC）

地址：1ERE AVENUE 2065 M L I D, 06516 CARROS, FRANCE

四、非泼罗尼吡丙醚滴剂（犬用）说明书和标签

（一）非泼罗尼吡丙醚滴剂（犬用）说明书

宠物用 外用药

【兽药名称】

通用名称：非泼罗尼吡丙醚滴剂（犬用）

商品名称：爱普多

英文名称：Fipronil and Pyriproxyfen Spot - on Solution（for dogs）

汉语拼音：Feipoluoni Bibingmi Diji（Quanyong）

【主要成分】 非泼罗尼、吡丙醚

【性状】 本品为无色至淡黄色澄清液体。

【药理作用】 **药效学** 非泼罗尼是一种对多种害虫具有防治效果的苯吡唑类广谱杀虫药。与昆虫中枢神经细胞膜上的 γ -氨基丁酸（GABA）受体结合，关闭神经细胞的氯离子通道，从而干扰中枢神经系统的正常功能而导致昆虫死亡。吡丙醚是一种昆虫生长调节剂（IGR），属于保幼激素类似物。能杀灭虫卵、幼虫、蛹及成蚤，并控制动物所到之处环境中跳蚤的感染。

药动学 本品按推荐剂量给药后，非泼罗尼和吡丙醚可很好的分布在毛发中，84 日非泼罗尼浓度至少为 100ng/g，吡丙醚浓度至少为 50ng/g。给药后 3~7 日非泼罗尼达最高血药浓度，7~14 日其主要代谢产物非泼罗尼砒化物达最高血药浓度。给药后 42 日非泼罗尼的血药浓度仍可检测到至少为 2.0ng/ml，70 日非泼罗尼砒化物的血药浓度至少为 0.2ng/ml。给药后 1~3 日吡丙醚达最高血药浓度，42 日吡丙醚的血药浓度仍可检测到至少为 2.0ng/ml。

【适应证】 用于治疗 and 预防犬体表的跳蚤（猫栉首蚤）和治疗蜱虫（篦子硬蜱、网纹革蜱、血红扇头蜱）感染。

跳蚤感染：使用一次有效性可持续 7 周。同时预防未来 12 周内跳蚤卵发育为成虫，从

而预防跳蚤增殖。

蜱虫感染：使用一次有效性可持续 2 周。并且在 4 周内预防感染。

【用法与用量】 外用。将犬颈部至肩部的被毛拨开，暴露皮肤。将药液均匀滴于皮肤 1～2 点处（大型犬可额外再选取背部皮肤 1～2 点给药）。每次 1 支，按表 1 选择不同体积的滴管。如需重复用药，可以一个月为周期再次进行治疗。

表 1 非泼罗尼吡丙醚滴剂（犬用）用法与用量表

犬体重	滴管规格
2～10kg	0.67ml
10～20kg	1.34ml
20～40kg	2.68ml
40kg 以上	选择合适滴管搭配*

*对于体重超过 40kg 的犬可选择合适的滴管规格搭配。

【不良反应】 使用本品后，可能在用药部位观察到短暂的皮肤反应（鳞屑、局部脱发、瘙痒、红斑、皮肤变色）和全身瘙痒或脱毛。在极少数情况下，可能出现唾液分泌增多，可逆性神经症状（过度敏感、抑郁、焦虑症状），呼吸系统症状或呕吐。

【注意事项】 1.本品非内服产品，仅供外用。用药前对犬称重，以避免用药过量。

2. 10 周龄以下和/或体重不足 2kg 及生病或虚弱的犬慎用。

3.本品不得用于兔。

4.非泼罗尼和吡丙醚的实验室研究未显示致畸性或胚胎毒性作用，但未对犬进行致畸研究，妊娠和哺乳期犬应经兽医风险/获益评估后使用本品。

5.对本品活性成分或辅料过敏的犬不得使用。

6.在缺乏额外的安全性数据下，4 周内不得重复用药。

7.该产品不能防止蜱虫附着动物，无法完全排除蜱虫传播疾病的风险。用药后 48 小时内可杀死篦子硬蜱。如果用药前已感染某些种类的蜱虫（如网纹革蜱、血红扇头蜱），那么对蜱虫的清除可能会超过 48 小时。

8.蜱虫一旦死亡，通常会从犬身体上掉落。未掉落的死亡蜱虫需小心剔除，确保蜱虫完全取出。

9.避免用药期间沐浴犬，从而保证用药期间的药效。偶尔少量淋水对治疗跳蚤及跳蚤卵发育没有影响，对蜱虫的治疗效果是否有影响尚未研究。

10.用药期间为减少再次感染，应使用合适的杀虫剂对犬的篮子、被褥和常规休息区，如地毯和玩具进行驱杀。为减少生活环境中其他跳蚤的影响，所有生活在同一家庭的动物也应使用合适的跳蚤控制产品进行驱杀。

11.用于犬干燥皮肤区域，避免舔舐及动物间互相舔舐。避免新用药的犬与其他动物玩耍或同寝。

12.避免犬眼睛和嘴接触本品。如接触，应立刻用水冲洗。避免在伤口及皮肤破损处使用。

13.待用药位点干燥后再与动物接触。新用药的犬不得和主人同寝。

14.本品可能对水体产生影响，用药后 2 日内禁止犬游泳。已用或未用完的产品应进行无害化处理。

15.给药者应注意，避免误食、手口接触，给药期间严禁吸烟和饮水或饮食，用药结束后洗手。一旦误食，请携带本品说明书和包装即时就诊。

16.置于儿童接触不到的地方。

【休药期】 无需制定。

【规格】 (1) 0.67ml：非泼罗尼 67mg+吡丙醚 20.1mg (2) 1.34ml：非泼罗尼 134mg+吡丙醚 40.2mg (3) 2.68ml：非泼罗尼 268mg+吡丙醚 80.4mg

【包装】 1 支/盒，2 支/盒，4 支/盒，24 支/盒或 60 支/盒。

【贮藏】 30℃以下，遮光、干燥处保存。

【有效期】 36 个月；滴管开启后立即使用。

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 法国维克有限公司（VIRBAC）

【生产厂名称】 法国维克有限公司（VIRBAC）

地址：1ERE AVENUE 2065 M L I D, 06516 CARROS, FRANCE

（二）非泼罗尼吡丙醚滴剂（犬用）标签

宠物用 外用药

【兽药名称】

通用名称：非泼罗尼吡丙醚滴剂（犬用）

商品名称：爱普多

英文名称：Fipronil and Pyriproxyfen Spot - on Solution（for dogs）

汉语拼音：Feipoluoni Bibingmi Diji（Quanyong）

【主要成分】 非泼罗尼、吡丙醚

【性状】 本品为无色至淡黄色澄清液体。

【适应证】 用于治疗 and 预防犬体表的跳蚤（猫栉首蚤）和治疗蜱虫（篦子硬蜱、网纹革蜱、血红扇头蜱）感染。

跳蚤感染：使用一次有效性可持续 7 周。同时预防未来 12 周内跳蚤卵发育为成虫，从而预防跳蚤增殖。

蜱虫感染：使用一次有效性可持续 2 周。并且在 4 周内预防感染。

【用法与用量】 外用。将犬颈部至肩部的被毛拨开，暴露皮肤。将药液均匀滴于皮肤 1～2 点处（大型犬可额外再选取背部皮肤 1～2 点给药）。每次 1 支，按表 1 选择不同体积的滴管。如需重复用药，可以一个月为周期再次进行治疗。

表 1 非泼罗尼吡丙醚滴剂（犬用）用法与用量表

犬体重	滴管规格
2～10kg	0.67ml
10～20kg	1.34ml
20～40kg	2.68ml
40kg 以上	选择合适滴管搭配*

*对于体重超过 40kg 的犬可选择合适的滴管规格搭配。

【规格】 (1) 0.67ml：非泼罗尼 67mg+吡丙醚 20.1mg (2) 1.34ml：非泼罗尼 134mg+吡丙醚 40.2mg (3) 2.68ml：非泼罗尼 268mg+吡丙醚 80.4mg

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 无需制定。

【贮藏】 30℃以下，遮光、干燥处保存。

【包装】 1支/盒，2支/盒，4支/盒，24支/盒或60支/盒。

【企业名称】 法国维克有限公司（VIRBAC）

【生产厂名称】 法国维克有限公司（VIRBAC）

地址：1ERE AVENUE 2065 M L I D, 06516 CARROS, FRANCE

五、鸡减蛋综合征灭活疫苗（BC14株）说明书和内包装标签

（一）鸡减蛋综合征灭活疫苗（BC14株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：鸡减蛋综合征灭活疫苗（BC14株）

商品名称：禽必威伊迪斯

英文名称：Avian Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated (Strain BC14)

汉语拼音：Ji Jiandanzonghezheng Miehuoyimiao (BC14 Zhu)

【主要成分与含量】 含灭活的鸡减蛋综合征病毒（BC14株），HI抗体效价几何平均值不低于1：128。

【性状】 乳白色乳剂。

【作用与用途】 用于预防鸡减蛋综合征。免疫产生期为4周，免疫期为16周。

【用法与用量】 用于蛋鸡和种鸡开产前接种，肌肉或颈下部皮下注射，每只0.5ml。

接种的最佳时间和方法在很大程度上取决于当地的具体情况。因此，接种前应征求当地兽医的意见。

【不良反应】 如按说明书正确接种健康鸡，应无严重不良反应。但有时在接种部位出现微肿，可持续数周，若接种时严格执行无菌操作，则不会造成永久性的组织损害。

【注意事项】 1.疫苗切勿冻结。

2.仅用于接种健康鸡。

3.使用前应将疫苗放至室温（15～25℃）。

4.接种前应摇匀。

5.应使用无菌注射器械进行接种。

6.疫苗瓶开启后应在3小时内用完。

7.本疫苗不得与其它疫苗混合使用。

8.如误将疫苗注入人体，应立即就医，并告诉医生本疫苗含有矿物油乳剂。

【规格】 1000羽份（500ml）/瓶

【包装】 12瓶/盒

【贮藏与有效期】 2～8℃保存，有效期为24个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 英特威国际有限公司（Intervet International B.V.）

【生产厂名称】 英特威国际有限公司（Intervet International B.V.）

地址：Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands

电话：+31（0）485587600

仅在兽医指导下使用

（二）鸡减蛋综合征灭活疫苗（BC14株）内包装标签

兽用

禽必威伊迪斯

鸡减蛋综合征灭活疫苗（BC14株）

1000羽份（500ml）/瓶

《进口兽药注册证书》证号：

批 号：

有效期至：

【作用与用途】 用于预防鸡减蛋综合征。免疫产生期为4周，免疫期为16周。

【用法与用量】 用于蛋鸡和种鸡开产前接种，肌肉或颈下部皮下注射，每只0.5ml。接种的最佳时间和方法在很大程度上取决于当地的具体情况。因此，接种前应征求当地兽医的意见。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为24个月。

【企业名称】 英特威国际有限公司（Intervet International B.V.）

【生产厂名称】 英特威国际有限公司（Intervet International B.V.）

仅在兽医指导下使用

六、猪圆环病毒2型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（重组杆状病毒P株+P株）说明书和内包装标签

（一）猪圆环病毒2型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（重组杆状病毒P株+P株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：猪圆环病毒2型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗(重组杆状病毒P株+P株)

商品名称：圆喘泰克

英文名称：*Porcine Circovirus Type 2, Mycoplasma Hyopneumoniae Vaccine, Inactivated (Recombinant Baculovirus Strain P + Strain P)*

汉语拼音：Zhu Yuanhuan Bingdu Erxing、Zhu Feiyan Zhiyuanti Erlian Miehuoyimiao (Chongzu GanzhuangBingdu P Zhu + P Zhu)

【主要成分与含量】 含灭活的猪肺炎支原体（P株）及由杆状病毒（P株）表达的猪圆环病毒2型衣壳蛋白。每头份含猪肺炎支原体灭活抗原相对效力 ≥ 1.1 和猪圆环病毒2型衣壳蛋白相对效力 ≥ 1.1 。

【性状】 为白色均匀混悬液，久置后底部可能有沉淀或分层现象，振摇后为白色均匀混悬液。

【作用与用途】 用于预防猪圆环病毒2型感染引起的疾病和预防猪支原体肺炎。免疫产生期为接种后33日，免疫期为5个月。

【用法与用量】 肌肉注射。用于10日龄及以上猪，每头1头份（1.0ml）。

【不良反应】 一般无可见的不良反应。如出现过敏反应，可用肾上腺素之类药物进行脱敏治疗。

【注意事项】 1.仅用于接种健康猪。

- 2.疫苗切勿冻结或长时间暴露在高温环境。
- 3.使用前充分摇匀，并将疫苗恢复室温。
- 4.开瓶后，应一次用完。
- 5.使用洁净注射器材。
- 6.不可与其它疫苗混合使用。
- 7.未用完的疫苗和使用后的疫苗瓶应销毁。
- 8.本品含有硫柳汞作为防腐剂。
- 9.屠宰前 21 日内禁止使用。

【规格】 (1) 10ml/瓶 (2) 20ml/瓶 (3) 50ml/瓶 (4) 100ml/瓶 (5) 250ml/瓶
(6) 500ml/瓶

【包装】 (1) 1 瓶/盒 (2) 10 瓶/盒

【贮藏与有效期】 2~8℃ 保存，有效期为 24 个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 美国法玛威生物制品股份有限公司 (Pharmgate Biologics Inc.)

【生产厂名称】 美国法玛威生物制品股份有限公司 (Pharmgate Biologics Inc.)

地址: 2635 University Ave W. Suite 140, St Paul, MN 55114, USA

仅在兽医指导下使用

(二) 猪圆环病毒2型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗 (重组杆状病毒P株+P株)

内包装标签

兽用

猪圆环病毒 2 型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗 (重组杆状病毒 P 株+P 株)
圆喘泰克

10 (20、50、100、250、500) ml/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

生产日期:

【作用与用途】 用于预防猪圆环病毒 2 型感染引起的疾病和预防猪支原体肺炎。免疫产生期为接种后 33 日，免疫期为 5 个月。

【用法与用量】 肌肉注射。用于 10 日龄及以上猪，每头 1 头份 (1.0ml)。

【贮藏与有效期】 2~8℃ 保存，有效期为 24 个月。

【企业名称】 美国法玛威生物制品股份有限公司 (Pharmgate Biologics Inc.)

【生产厂名称】 美国法玛威生物制品股份有限公司 (Pharmgate Biologics Inc.)

地址: 2635 University Ave W. Suite 140, St Paul, MN 55114 USA

仅在兽医指导下使用

七、鸡痘活疫苗 (DCEP25 株) 说明书和内包装标签

(一) 鸡痘活疫苗 (DCEP25 株) 说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称: 鸡痘活疫苗 (DCEP25株)

商品名称: 百痘保

英文名称: Avian Pox Vaccine, Live (Strain DCEP25)

汉语拼音: Jidou Huoyimiao (DCEP25 Zhu)

【主要成分与含量】 含鸡痘病毒 (DCEP25 弱毒株) 至少 $10^{3.0}$ CCID₅₀/羽份。

【性状】 浅黄色或灰白色海绵状疏松团块, 易与瓶壁脱离, 加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防鸡痘。4 周龄鸡接种, 免疫产生期为 14 日, 免疫期为 3 个月。

【用法与用量】 按瓶签注明羽份稀释疫苗, 经翅下刺种或皮肤划痕 (大腿外侧) 接种, 每只 0.01ml。

推荐免疫接种程序为: 在清洁鸡场, 从 4 周龄时开始进行免疫接种, 饲养超过 18 个月的每年加强接种 1 次; 在污染鸡场, 4 周龄时进行首次接种, 3 个月后加强接种 1 次, 以后每年加强接种 1 次。

【不良反应】 一般无可见的不良反应。

【注意事项】 1. 疫苗稀释后应立即使用。

2. 仅用于接种健康鸡。

3. 4 周龄以下鸡禁用。

4. 稀释和接种时, 应执行常规无菌操作。

5. 用过的疫苗、器具和未用完的疫苗等应进行消毒处理。

【规格】 1000 羽份/瓶

【包装】 10 瓶/盒

【贮藏与有效期】 2℃~8℃ 保存, 有效期为 24 个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 德国勃林格殷格翰动物保健有限公司 (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

【生产厂名称】 勃林格殷格翰动物保健有限公司意大利生产厂 (Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A)

地址: Via Baviera, 9-35027 NOVENTA PADOVANA (PD)

仅在兽医指导下使用

(二) 鸡痘活疫苗 (DCEP25 株) 内包装标签

兽用

百痘保

鸡痘活疫苗 (DCEP25 株)

1000 羽份/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防鸡痘。

【贮藏与有效期】 2℃~8℃ 保存, 有效期为 24 个月。

【企业名称】 德国勃林格殷格翰动物保健有限公司

【生产厂名称】 勃林格殷格翰动物保健有限公司意大利生产厂

仅在兽医指导下使用