

附件 3（略）

附件 4（略）

附件 5

说明书和标签

一、枸橼酸马罗匹坦标签

兽用

【兽药名称】

通用名称：枸橼酸马罗匹坦

英文名称：Maropitant Citrate

汉语拼音：Juyuansuan Maluopitan

【包装规格】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【运输注意事项】 防潮，防晒。

【贮藏】 密封，避光，常温保存。

【批准文号】

【生产企业】

地址：

二、枸橼酸马罗匹坦注射液说明书和标签

（一）枸橼酸马罗匹坦注射液说明书

宠物用

【兽药名称】

通用名称：枸橼酸马罗匹坦注射液

商品名称：

英文名称：Maropitant Citrate Injection

汉语拼音：Juyuansuan Maluopitan Zhusheye

【主要成分】 枸橼酸马罗匹坦

【性状】 本品为无色至浅黄色澄明液体。

【药理作用】 马罗匹坦为神经激肽（NK1）受体拮抗剂。呕吐是呕吐中枢的一种复杂调整过程，呕吐中枢接收和整合来自中枢神经刺激、外周神经刺激以及血液循环和脑脊液中化学物质刺激而产生呕吐反应。P 物质为一类与呕吐有关的神经递质，阻断 P 物质与受体间的结

合可有效抑制中枢神经性呕吐、外周神经性呕吐以及化学因素引起的呕吐。马罗匹坦能阻断中枢神经系统中的 P 物质与受体结合，起到止吐作用。

【适应证】 用于预防和治疗犬使用化疗药物引起的呕吐；预防除晕动性呕吐以外的呕吐；与其他支持疗法合用治疗呕吐。

用于预防猫除晕动性呕吐以外的呕吐；缓解恶心；与其他支持疗法合用治疗呕吐。

【用法与用量】 以马罗匹坦计。犬皮下注射：一次量，8 周龄及以上犬，每 1kg 体重 1.0mg，一日 1 次，最多连用 5 日。

猫皮下注射：一次量，16 周龄及以上猫，每 1kg 体重 1.0mg，一日 1 次，最多连用 5 日。

【不良反应】

1 本品推荐剂量可引起腹泻（7.8%）、厌食（5.2%）、注射部位肿胀或疼痛（4.0%）；罕见（ $1/10000 < \text{发生率} < 1/1000$ ）嗜睡、血尿、抓挠等；犬极罕见（发生率 $< 1/10000$ ）发生过敏反应，如过敏性水肿、荨麻疹、红斑、虚脱、呼吸困难和黏膜苍白等。治疗期间犬可能出现大量流涎。高剂量下上述多种不良反应可同时发生，但程度均较轻，且停药后不良反应症状会逐渐消失。小于 11 周龄的犬，可增加骨髓细胞减少症的发生。

2 约 1/3 的猫皮下注射时可能发生注射部位疼痛，为中度至重度疼痛反应。猫极罕见（发生率 $< 1/10000$ ）发生过敏反应，如过敏性水肿、荨麻疹、红斑、虚脱、呼吸困难、黏膜苍白等。

【注意事项】

1 用于治疗呕吐时，犬猫应提前 1h 以上注射本品。犬用于预防化疗药物引起的呕吐，建议在犬使用化疗药物之前给予本品，预防呕吐作用更佳。

2 呕吐可能是某些严重疾病（如肠梗阻）的伴随症状，犬猫应明确诊断后使用本品。

3 肝功能障碍的犬猫慎用。

4 未在低于 8 周龄犬、低于 16 周龄猫、以及妊娠或哺乳期母犬及母猫中确立本品的安全性，如果使用，需通过兽医进行获益/风险评估。

5 马罗匹坦对钙和钾离子通道有亲和性，患有心脏疾病的犬慎用，且不能与钙离子拮抗剂合用。

6 由于犬猫在皮下注射时经常发生过短暂疼痛，可采用适当的动物保定措施。注射冷藏温度的本品可减少注射时的疼痛反应。

7 马罗匹坦与犬猫血浆蛋白的结合率大于 99%，可能会与其他高血浆蛋白结合率药物存在竞争。

8 未进行本产品与其他兽药的相容性研究，禁止将本产品与其他兽药产品在同一注射器内混用。

9 不同的年龄猫对马罗匹坦的体内药代动力学不同，幼猫对马罗匹坦的体内清除率高于成年猫。

10 置于儿童不可触及处。

11 施药者接触本品可能会引起皮肤局部过敏反应，长期或多次接触药物也可导致皮肤

致敏反应，使用时做好防护，意外接触本品时可用肥皂水或清水清洗。

12 本品对眼睛具有刺激性，施药者眼睛如意外接触本品，用清水冲洗 15 分钟并就医。

【休药期】 无需制定。

【规格】 按马罗匹坦计 20ml : 0.2g

【包装】

【贮藏】 10~30℃，密闭保存。

【有效期】 36 个月；开启后为 28 天。

【批准文号】

【生产企业】

地址：

（二）枸橼酸马罗匹坦注射液标签

宠物用

【兽药名称】

通用名称：枸橼酸马罗匹坦注射液

商品名称：

英文名称：Maropitant Citrate Injection

汉语拼音：Juyuansuan Maluopitan Zhushuye

【主要成分】 枸橼酸马罗匹坦

【性状】 本品为无色至浅黄色澄明液体。

【适应证】 用于预防和治疗犬使用化疗药物引起的呕吐；预防除晕动性呕吐以外的呕吐；与其他支持疗法合用治疗呕吐。

用于预防猫除晕动性呕吐以外的呕吐；缓解恶心；与其他支持疗法合用治疗呕吐。

【用法与用量】 以马罗匹坦计。犬皮下注射：一次量，8 周龄及以上犬，每 1kg 体重 1.0mg，一日 1 次，最多连用 5 日。

猫皮下注射：一次量，16 周龄及以上猫，每 1kg 体重 1.0mg，一日 1 次，最多连用 5 日。

【规格】 按马罗匹坦计 20ml : 0.2g

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【休药期】 无需制定。

【包装】

【贮藏】 10~30℃，密闭保存。

【生产企业】

地址：

三、氟雷拉纳标签

兽用

【兽药名称】

通用名称：氟雷拉纳

英文名称：Fluralaner

汉语拼音：Fuleilana

【包装规格】

【生产批号】

【生产日期】

【有效期】至

【运输注意事项】 注意防潮；正面向上摆放。

【贮藏】 密闭保存。

【批准文号】

【生产企业】

地址：

四、氟雷拉纳滴剂说明书和标签

（一）氟雷拉纳滴剂说明书

宠物用 外用药

【兽药名称】

通用名称：氟雷拉纳滴剂

商品名称：

英文名称：Fluralaner Spot-on Solution

汉语拼音：Fuleilana Diji

【主要成分】 氟雷拉纳

【性状】 本品为无色至黄色澄清液体。

【药理作用】 药效学 氟雷拉纳是一种异噁唑啉类杀虫剂和杀螨剂，其作用机理主要通过干扰 γ -氨基丁酸（GABA）门控氯离子通道，使氯离子无法渗透进入突触后膜，干扰神经系统的跨膜信号传递，导致昆虫神经系统紊乱，进而死亡。氟雷拉纳与脘类、大环内酯类、拟除虫菊酯类、狄氏剂等无交叉耐药性。

氟雷拉纳为全身性抗寄生虫药，驱杀犬体表的跳蚤的作用可持续 12 周。氟雷拉纳对成年跳蚤（猫栉首蚤）起效快，持续时间长，还可阻止跳蚤产卵，破坏跳蚤的生命周期。

【适应证】 用于治疗犬体表的跳蚤（猫栉首蚤）感染。本品可作为跳蚤过敏性皮炎（FAD）临床治疗方案的一部分进行使用。

【用法与用量】 以氟雷拉纳计。外用，将本品滴于犬后背肩部到臀部间的皮肤，每 1kg 体重，犬 $\geq$ 25mg，具体见推荐使用剂量表，每 12 周给药 1 次。

表 1 犬按体重推荐使用剂量表

体重 BW (kg)	规格	数量 (支)
$2 \leq BW \leq 4.5$	0.4ml : 0.1125g	1
$4.5 < BW \leq 10$	0.89ml : 0.25g	1
$10 < BW \leq 20$	1.79ml : 0.5g	1
$BW > 20$	选择合适的规格组合使用	

【不良反应】 临床研究中个别犬给药部位出现轻度和一过性皮肤反应，如红斑和脱毛（占治疗犬的 1.2%）。

【注意事项】

- 1 因缺乏相关数据，小于 8 周龄或体重低于 2kg 的犬不得使用。
- 2 本品为外用药，不得内服。避免给药犬之间互相舔舐梳毛。
- 3 对本品过敏的犬不得使用。有神经系统疾病史的犬应谨慎使用本品。
- 4 给药间隔不得短于 8 周。
- 5 可用于种犬、妊娠期和泌乳期母犬。
- 6 8~9 周龄体重为 2.0~3.7kg 的幼犬，局部给药 5 倍最大推荐剂量氟雷拉纳，每 8 周给药 1 次，共给药 3 次，未观察到不良反应。比格犬内服 3 倍最大推荐剂量的氟雷拉纳，未发现对繁殖能力有影响，也未发现对后代生存能力有影响。多药耐药基因缺失（MDR1^{-/-}）的柯利牧羊犬，内服 3 倍最大推荐剂量的氟雷拉纳具有良好耐受性，未观察到治疗相关的临床症状。
- 7 氟雷拉纳的血浆蛋白结合率高，可能与其他高蛋白结合率的药物竞争血浆蛋白，如非甾体抗炎药、香豆素衍生物华法林等。体外血浆孵育试验未发现氟雷拉纳与卡洛芬和华法林竞争血浆蛋白结合。临床试验未发现氟雷拉纳与犬的日常用药存在相互作用。
- 8 若出现任何严重反应或本说明书未提及的其他不良反应，应及时咨询兽医。
- 9 本品起效快，可降低虫媒病的传播风险，但跳蚤必须接触宿主并且开始进食才能接触活性药物成分，跳蚤（猫栉首蚤）在接触犬 8 小时内起作用，因此在极其恶劣条件下，不能完全排除通过寄生虫为媒介传播疾病的风险。
- 10 本品具有轻微刺激性，不得滴于犬皮肤破损处。应避免与犬眼睛接触。
- 11 为保证疗效，治疗 3 日内不要将犬浸入水中、犬不要洗澡或游泳。
- 12 少数人皮肤接触后会有刺痛或麻木感。处理产品和对犬给药时，应佩戴一次性防护手套。一旦接触皮肤，应立即用肥皂和水清洗；本品具有眼刺激性，一旦与眼睛接触，应立即用水冲洗。对本品活性成分过敏的人请勿给药。皮肤敏感者或者已知易过敏体质如其他同类兽药过敏者在给药或接触已给药动物时应谨慎。犬用药部位干燥前，避免接触犬给药部位。
- 13 误食本品有毒，操作人员意外摄入时，应立即携带包装和说明书就医处理。
- 14 避免儿童接触本品。
- 15 本品高度易燃。应避热，远离火源。一旦发生溅出，如溅到桌子或地板上，用纸巾

清除溅出产品并用清洁剂进行清洗。

16 氟雷拉纳对水生无脊椎动物有毒，未使用产品不应弃入下水道及河道。

【休药期】 无需制定。

【规格】 (1) 0.4ml : 0.1125g (2) 0.89ml : 0.25g (3) 1.79ml : 0.5g

【包装】

【贮藏】 密封保存。

【有效期】 36 个月

【批准文号】

【生产企业】

地址：

(二) 氟雷拉纳滴剂标签

宠物用 外用药

【兽药名称】

通用名称：氟雷拉纳滴剂

商品名称：

英文名称：Fluralaner Spot-on Solution

汉语拼音：Fuleilana Diji

【主要成分】 氟雷拉纳

【性状】 本品为无色至黄色澄清液体。

【适应证】 用于治疗犬体表的跳蚤（猫栉首蚤）感染。本品可作为跳蚤过敏性皮炎（FAD）临床治疗方案的一部分进行使用。

【用法与用量】 以氟雷拉纳计。外用，将本品滴于犬后背肩部到臀部间的皮肤，每 1kg 体重，犬 $\geq$ 25mg，具体见推荐使用剂量表，每 12 周给药 1 次。

表 1 犬按体重推荐使用剂量表

体重 BW (kg)	规格	数量 (支)
$2 \leq BW \leq 4.5$	0.4ml : 0.1125g	1
$4.5 < BW \leq 10$	0.89ml : 0.25g	1
$10 < BW \leq 20$	1.79ml : 0.5g	1
$BW > 20$	选择合适的规格组合使用	

【规格】 (1) 0.4ml : 0.1125g (1) 0.89ml : 0.25g (2) 1.79ml : 0.5g

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 无需制定。

【包装】

【贮藏】 密封保存。

【生产企业】

地址：

五、氟雷拉纳溶液说明书和标签

（一）氟雷拉纳溶液说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：氟雷拉纳溶液

商品名称：

英文名称：Fluralaner Solution

汉语拼音：Fuleilana Rongye

【主要成分】 氟雷拉纳

【性状】 本品为淡黄色至深黄色澄清液体。

【药理作用】 药效学 氟雷拉纳为异噁唑啉类杀虫剂和杀螨剂，通过拮抗 γ -氨基丁酸受体和谷氨酸受体门控氯离子通道，使氯离子无法渗透进入突触后膜，干扰神经系统的跨膜信号传递，导致部分节肢动物神经系统紊乱，进而死亡。氟雷拉纳与狄氏剂不具有交叉耐药性。螨虫通过吸血进食接触氟雷拉纳，氟雷拉纳对鸡皮刺螨在4小时内起效，抑制雌螨产卵，破坏螨虫的生命周期。首次给药后，药效可以持续15日。体外生物分析结果显示氯雷拉纳对有机磷酸酯、拟除虫菊酯类和氨基甲酸盐类抗寄生虫药耐药的螨虫有效。

【适应证】 用于治疗后备鸡、产蛋鸡、种鸡的鸡皮刺螨（红螨）感染。

【用法与用量】 以本品计。混饮：鸡每1kg体重0.05ml（相当于以氟雷拉纳计每1kg体重0.5mg），每隔7日给药1次，连用2次。

每日所需本品用量（ml/日）=拟治疗鸡群的体重总估值（kg） $\times$ 0.05（ml/kg）。

【不良反应】 按推荐的用法与用量使用，未观察到不良反应。

【注意事项】

1 为取得满意的治疗效果，应给予足量足程治疗；为减少耐药性，不宜长期频繁使用同一类除螨剂。

2 药液应现用现配。根据拟治疗的鸡群体重总估值，计算每日所需本品用量，再估计鸡饮水给药时间内消耗的饮水量进行稀释，一般饮水时间为4~8小时，具体时间应根据鸡龄、体重、气候干燥程度确定。药液饮完后更换清水。

3 应采取生物安全防范措施，防止治疗家禽再感染。为保障给药圈舍的寄生虫感染得到长期控制，必要时对即将发病的鸡同时给药。

4 本品的给药间隔不得低于3个月。

5 未进行相容性研究前，本品不得与其他兽药产品混合使用。

6 成年鸡和3周龄鸡按5倍推荐剂量3倍推荐给药时间治疗，未见毒性反应；产蛋鸡

按 5 倍推荐剂量 3 倍推荐给药时间治疗，产蛋量无不良影响；种鸡按 3 倍推荐剂量 2 倍推荐给药时间治疗，繁殖性能未见不良影响。

7 本品对皮肤和/或眼睛具有轻微刺激性，应避免本品接触皮肤、眼睛及黏膜。给药时，不得饮食、喝水或抽烟；眼睛接触药液后，应立即用水彻底冲洗；使用本品后，脱下受污染的衣服，用肥皂洗手和皮肤。

8 避免儿童接触本品。

9 未使用完的兽药及包材，应进行无害化处理，本品有水生生物毒性，不得将本品弃入河道。

【休药期】 鸡 14 日，弃蛋期 0 日。

【规格】 1%

【包装】

【贮藏】 密封保存。

【有效期】 36 个月；包装开启后室温 12 个月；配制成药液后室温 24 小时。

【批准文号】

【生产企业】

（二）氟雷拉纳溶液标签

兽用

【兽药名称】

通用名称：氟雷拉纳溶液

商品名称：

英文名称：Fluralaner Solution

汉语拼音：Fuleilana Rongye

【主要成分】 氟雷拉纳

【性状】 本品为淡黄色至深黄色澄清液体。

【适应证】 用于治疗后备鸡、产蛋鸡、种鸡的鸡皮刺螨（红螨）感染。

【用法与用量】 以本品计。混饮：鸡每 1kg 体重 0.05ml（相当于以氟雷拉纳计每 1kg 体重 0.5mg），每隔 7 日给药 1 次，连用 2 次。

每日所需本品用量（ml/日）=拟治疗鸡群的体重总估值（kg）×0.05（ml/kg）。

【规格】 1%

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 鸡 14 日，弃蛋期 0 日。

【包装】

【贮藏】 密封保存。

【生产企业】

地址：

六、犬细小病毒免疫球蛋白说明书和标签

（一）犬细小病毒免疫球蛋白说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：犬细小病毒免疫球蛋白

商品名称：无

英文名称：Canine Parvovirus Immunoglobulin

汉语拼音：Quan Xixiaobingdu Mianyiqiudanbai

【主要成分与含量】 犬细小病毒免疫球蛋白，蛋白质含量不低于 30mg/ml，纯度不低于 95%。

【性状】 无色或淡黄色澄明液体，可带轻微乳光。

【作用与用途】 用于犬细小病毒感染时的紧急治疗和感染发病后的治疗。

【用法与用量】 静脉推注或滴注。使用量少时，可直接静脉推注。使用量多时，可用 5% 葡萄糖注射液适当稀释后进行静脉滴注。

（1）输注剂量：根据患犬体重，按每次 2.0ml/kg 静脉输注，连用 5~7 日。

（2）输注速度：每分钟不超过 0.5ml 为宜。但在开始 15 分钟内，应注意缓慢加速至上述速度。

【不良反应】 一般无明显的不良反应；偶有出现过敏反应，应立即注射肾上腺素。

【注意事项】

- 1 用前应使制品温度升至室温。
- 2 开瓶启用后，应一次性用完。
- 3 制品呈现混浊、沉淀或有异物及瓶子有裂纹、过期失效等情况，不可使用。
- 4 输注过程中如发现患犬有不适反应，应立即停止输用。
- 5 运输及储藏过程中严禁冻结。

【规格】

【包装】

【贮藏与有效期】 2~8℃ 保存，有效期为 24 个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

（二）犬细小病毒免疫球蛋白内包装标签

兽用

犬细小病毒免疫球蛋白

批准文号：

批 号：

有效期至：

【作用与用途】 详见说明书。

【用法与用量】 静脉推注或滴注。使用量少时，可直接静脉推注。使用量多时，可用 5% 葡萄糖注射液适当稀释后进行静脉滴注。

(1) 输注剂量：根据患犬体重，按每次 2.0ml/kg 静脉输注，连用 5~7 日。

(2) 输注速度：每分钟不超过 0.5ml 为宜。但在开始 15 分钟内，应注意缓慢加速至上述速度。

【贮藏与有效期】 2~8℃ 保存，有效期为 24 个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

七、鸭病毒性肝炎二价活疫苗（1 型 BJ80 株+3 型 HB80 株）说明书和标签

（一）鸭病毒性肝炎二价活疫苗（1 型 BJ80 株+3 型 HB80 株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：鸭病毒性肝炎二价活疫苗（1 型 BJ80 株+3 型 HB80 株）

商品名称：

英文名称：Duck Viral Hepatitis Bivalent Vaccine, Live (Type 1 Strain BJ80+Type 3 Strain HB80)

汉语拼音：Ya Bingduxingganyan Erjia Huoyimiao（1Xing BJ80zhu+3Xing HB80zhu）

【主要成分与含量】 疫苗中含有 1 型鸭甲型肝炎病毒 BJ80 株，每羽份冻干前病毒含量为 $10^{5.5}$ ELD₅₀；同时含有 3 型鸭甲型肝炎病毒 HB80 株，每羽份冻干前病毒含量为 $10^{6.0}$ DELD₅₀。

【性状】 淡红色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加无菌生理盐水后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防 1 型和 3 型鸭甲型肝炎病毒引起的雏鸭病毒性肝炎，接种后 4~7 日产生免疫力，免疫期为 35 日。

【用法与用量】 颈部皮下注射。按瓶签注明羽份，用无菌生理盐水稀释为每 0.5ml 含 1 羽份。1~3 日龄鸭每只注射 0.5ml。

【不良反应】 一般无可见的不良反应。

【注意事项】

- 1 本品仅用于接种健康雏鸭。
- 2 稀释后应放阴凉处，限 4 小时内用完。
- 3 在保存及运输过程中，禁忌阳光照射和高热。

4 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

5 当 1~3 日龄鸭平均母源抗体高于 1:32 时,应在 5~7 日龄时免疫。

【规格】 100 羽份/瓶、200 羽份/瓶、500 羽份/瓶、1000 羽份/瓶。

【包装】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为 24 个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 鸭病毒性肝炎二价活疫苗(1 型 BJ80 株+3 型 HB80 株)内包装标签

兽用

鸭病毒性肝炎二价活疫苗(1 型 BJ80 株+3 型 HB80 株)

100 (200、500、1000) 羽份/瓶

批准文号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 详见说明书。

【用法与用量】 颈部皮下注射。按瓶签注明羽份,用无菌生理盐水稀释为每 0.5ml 含 1 羽份。1~3 日龄鸭每只注射 0.5ml。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为 24 个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

八、鸡新城疫、禽流感(H9 亚型)、传染性法氏囊病、禽腺病毒病

(I 群, 4 型) 四联灭活疫苗(La Sota 株+A15 株+VP2 蛋白+Fiber2 蛋白)说明书和标签

(一) 鸡新城疫、禽流感(H9 亚型)、传染性法氏囊病、禽腺病毒病(I 群, 4 型) 四联灭活疫苗(La Sota 株+A15 株+VP2 蛋白+Fiber2 蛋白)说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称: 鸡新城疫、禽流感(H9 亚型)、传染性法氏囊病、禽腺病毒病(I 群, 4 型) 四联灭活疫苗(La Sota 株+A15 株+VP2 蛋白+Fiber2 蛋白)

商品名称:

英文名称: Newcastle Disease, Avian Influenza (Subtype H9), Infectious Bursal Disease, Fowl Adenovirus (Group I, Type 4) Vaccine, Inactivated (Strain La Sota+Strain A15+Protein VP2+Protein Fiber2)

汉语拼音: Ji Xinchengyi Qinliugan (H9 Yaxing) Chuanranxingfashinangbing
Qinxianbingdubing (I Qun, 4 Xing) Silian Miehuoyimiao (La Sota Zhu+A15 Zhu+VP2 Danbai+
Fiber2 Danbai)

【主要成分与含量】 疫苗中含灭活的鸡新城疫病毒 La Sota 株, 灭活前毒价为 $10^{9.0}$ EID₅₀/0.1ml; 含灭活的禽流感 (H9 亚型) 病毒 A15 株, 灭活前毒价为 $10^{9.0}$ EID₅₀/0.1ml; 含灭活的鸡传染性法氏囊病病毒 VP2 表达蛋白, 灭活前琼脂扩散效价为 1:128; 含灭活的禽腺病毒血清 4 型 Fiber2 表达蛋白, 灭活前琼脂扩散效价为 1:64。

【性状】 白色均匀乳剂。

【作用与用途】 用于预防鸡新城疫、禽流感 (H9 亚型, h9.4.2.5b 分支)、鸡传染性法氏囊病和禽腺病毒病 (I 群, 4 型)。免疫产生期为 21 日; 免疫期为 4 个月。

【用法与用量】 颈部皮下注射。1~4 周龄鸡, 每只 0.3ml; 4 周龄以上鸡, 每只 0.5ml。

【不良反应】 一般无明显的不良反应。

【注意事项】

- 1 本品仅用于接种健康鸡群。
- 2 使用前恢复至室温, 摇匀后使用。
- 3 疫苗开启后应限当日用完。
- 4 接种器具应无菌, 注射部位应消毒。
- 5 剩余疫苗、疫苗瓶应做无害化处理。

【规格】

【贮藏与有效期】 2~8℃ 保存, 有效期为 18 个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 鸡新城疫、禽流感 (H9 亚型)、传染性法氏囊病、禽腺病毒病 (I 群, 4 型) 四联灭活疫苗 (La Sota 株+A15 株+VP2 蛋白+Fiber2 蛋白) 内包装标签

兽用

**鸡新城疫、禽流感 (H9 亚型)、传染性法氏囊病、禽腺病毒病 (I 群, 4 型) 四联
灭活疫苗 (La Sota 株+A15 株+VP2 蛋白+Fiber2 蛋白)**

批准文号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 详见说明书。

【用法与用量】 颈部皮下注射。1~4 周龄鸡, 每只 0.3ml; 4 周龄以上鸡, 每只 0.5ml。

【贮藏与有效期】 2~8℃ 保存, 有效期为 18 个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

九、麻杏石甘丸说明书和标签

（一）麻杏石甘丸说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：麻杏石甘丸

商品名称：

汉语拼音：Maxing Shigan Wan

【主要成分】 麻黄、苦杏仁、石膏、甘草。

【性状】 本品为淡黄色的水丸；气微香，味辛、苦、涩。

【功能与主治】 清热，宣肺，平喘。主治鸡肺热咳嗽。

【用法与用量】 内服：一次量，鸡 20～60 丸，一日 1 次，连用 3 日。均匀散布于料槽，自由采食。

【不良反应】 按规定用法与用量使用，暂未见不良反应。

【注意事项】 暂无规定。

【规格】 每 100 丸重 4.8g。

【包装】

【贮藏】 密封

【有效期】 24 个月

【批准文号】

【生产企业】

（二）麻杏石甘丸标签

兽用

【兽药名称】

通用名称：麻杏石甘丸

商品名称：

汉语拼音：Maxing Shigan Wan

【主要成分】 麻黄、苦杏仁、石膏、甘草。

【性状】 本品为淡黄色的水丸；气微香，味辛、苦、涩。

【功能与主治】 清热，宣肺，平喘。主治鸡肺热咳嗽。

【用法与用量】 内服：一次量，鸡 20～60 丸，一日 1 次，连用 3 日。均匀散布于料槽，自由采食。

【规格】 每 100 丸重 4.8g。

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【包装】

【贮藏】 密封。

【生产企业】

十、盐酸沃尼妙林溶液说明书和标签

（一）盐酸沃尼妙林溶液说明书

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：盐酸沃尼妙林溶液

商品名称：

英文名称：Valnemulin Hydrochloride Solution

汉语拼音：Yansuan Wonimiaolin Rongye

【主要成分】 盐酸沃尼妙林

【性状】 本品为淡黄色至棕黄色澄清液体。

【药理作用】 **药效学** 沃尼妙林属截短侧耳素类抗生素，其抗菌活性强，抗菌谱广，对鸡毒支原体有较强的抑制作用。其作用机理为通过与病原微生物核糖体上的 50S 亚基结合，抑制病原微生物蛋白质的合成，导致病原微生物死亡。

药动学 鸡内服给药时，沃尼妙林在体内吸收迅速，平均达峰时间在 2~3h，半衰期约 2.5h，绝对生物利用度为 68.7%~77.6%。沃尼妙林在鸡体内排泄迅速，无明显蓄积。

【适应证】 用于治疗鸡毒支原体引起的慢性呼吸道疾病。

【用法与用量】 以本品计。混饮：每 1L 水，鸡，0.2~0.3mL，连用 5 日。

【不良反应】 按推荐剂量使用暂未见不良反应。

【注意事项】

1 在使用沃尼妙林期间或用药前后 5 日内，禁止与盐霉素、莫能菌素和甲基盐霉素等离子载体类药物合用。

2 产蛋供人食用的鸡，在产蛋期不得使用。

3 避免直接接触皮肤和黏膜。

4 产品开封后请注意密封保存。

【休药期】 鸡 2 日。

【规格】 30%

【包装】

【贮藏】 密封保存。

【有效期】 24 个月，包装开封后室温 30 日。

【批准文号】

【生产企业】

地址：

（二）盐酸沃尼妙林溶液标签

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：盐酸沃尼妙林溶液

商品名称：

英文名称：Valnemulin Hydrochloride Solution

汉语拼音：Yansuan Wonimiaolin Rongye

【主要成分】 盐酸沃尼妙林

【性状】 本品为淡黄色至棕黄色澄清液体。

【适应证】 用于治疗鸡毒支原体引起的慢性呼吸道疾病。

【用法与用量】 以本品计。混饮：每 1L 水，鸡，0.2~0.3mL，连用 5 日。

【不良反应】 按推荐剂量使用暂未见不良反应。

【注意事项】

1 在使用沃尼妙林期间或用药前后 5 日内，禁止与盐霉素、莫能菌素和甲基盐霉素等
离子载体类药物合用。

2 产蛋供人食用的鸡，在产蛋期不得使用。

3 避免直接接触皮肤和黏膜。

4 产品开封后请注意密封保存。

【规格】 30%

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【休药期】 鸡 2 日。

【包装】

【贮藏】 密封保存。

【生产企业】

地址：

十一、醋酸泼尼松龙片说明书和标签

（一）醋酸泼尼松龙片说明书

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：醋酸泼尼松龙片

商品名称：

英文名称：Prednisolone Acetate Tablets

汉语拼音：Cusuan Ponisonglong Pian

【主要成分】 醋酸泼尼松龙

【性状】 本品为白色刻痕片。

【药理作用】 **药效学** 肾上腺皮质激素药。本品具有抗炎、抗过敏和抑制免疫等多种药理作用，可减轻和防止组织对炎症的反应，缓解炎症的表现；抑制细胞介导的免疫反应和延迟性过敏反应，并减轻原发免疫反应的进一步放大扩散，发挥抗过敏和免疫抑制作用。

药动学 本品内服后，在体内极易自消化道吸收，其本身以活性形式存在，无须经肝脏转化即发挥生物效应。猫按 2mg/kg 体重（以醋酸泼尼松龙计）单剂量内服，泼尼松龙在体内的血药峰浓度（ C_{max} ）约为 $137.32 \pm 97.77 \text{ ng/mL}$ ，达峰时间（ t_{max} ）约为 0.94 ± 0.40 小时，药时曲线下面积（ AUC_{0-t} ）约为 $312.21 \pm 254.18 \text{ ng} \cdot \text{h/mL}$ ，消除半衰期（ $t_{1/2}$ ）约为 1.17 ± 0.39 小时。

【适应证】 用于控制猫过敏性皮炎引起的瘙痒和皮炎症状。

【用法与用量】 以醋酸泼尼松龙计。内服：一次量，每 1kg 体重，猫 1~2mg，早、晚各 1 次，给药 7 日，然后调整为隔天给药（早、晚各 1 次），连续给药 14 日。或参考下表给药：

醋酸泼尼松龙片推荐剂量表

体重 BW (kg)	$2.0 \leq BW \leq 2.5$	$2.5 < BW \leq 5$	$5 < BW \leq 10$
给药量 (片)	1/2	1	2

【不良反应】

- 1 本品按推荐的用法与用量使用，猫会出现饮水增多情况。
- 2 大剂量或长期用药可能会导致多饮、多尿、多食、脱毛、被毛粗乱、腹部下垂等症；突然停药后可能出现精神沉郁、体质衰弱、嗜睡等医源性肾上腺皮质功能减退样症状。

【注意事项】

- 1 本品未对体重低于 2kg 的猫进行安全性评价，给药前需全面的风险/获益评估。
- 2 不得用于妊娠期和哺乳期的猫。
- 3 不得用于体外寄生虫、细菌、真菌等病原体感染所致的皮炎。
- 4 伴有急性细菌性感染时，应联合抗菌药使用。
- 5 长期用药不得骤然停药，应逐渐减量，直至停药。
- 6 心脏病或急性心力衰竭、糖尿病、全身性真菌感染、青光眼、肝功能损害、眼单纯性疱疹、高脂蛋白血症、高血压、甲状腺功能减退（此时糖皮质激素作用增强）、重症肌无力、骨质疏松、胃溃疡、胃炎或食管炎、肾功能损害或结石等需谨慎控制使用本品。
- 7 本品不得超过推荐剂量使用，且接受治疗的猫应接受密切监测。

【休药期】 无需制定

【规格】 5mg

【包装】

【贮藏】 遮光，密封保存。

【有效期】 36 个月

【批准文号】

【生产企业】

地址：

（二）醋酸泼尼松龙片标签

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：醋酸泼尼松龙片

商品名称：

英文名称：Prednisolone Acetate Tablets

汉语拼音：Cusuan Ponisonglong Pian

【主要成分】 醋酸泼尼松龙。

【性状】 本品为白色刻痕片。

【适应证】 用于控制猫过敏性皮炎引起的瘙痒和皮炎症状。

【用法与用量】 以醋酸泼尼松龙计。内服：一次量，每 1kg 体重，猫 1~2mg，早、晚各 1 次，给药 7 日，然后调整为隔天给药（早、晚各 1 次），连续给药 14 日。或参考下表给药：

醋酸泼尼松龙片推荐剂量表

体重 BW (kg)	$2.0 \leq BW \leq 2.5$	$2.5 < BW \leq 5$	$5 < BW \leq 10$
给药量 (片)	1/2	1	2

【规格】 5mg

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【休药期】 无需制定

【贮藏】 遮光，密封保存。

【包装】

【生产企业】

地址：

十二、猫疱疹病毒 1 型胶体金检测试纸条说明书和标签

（一）猫疱疹病毒 1 型胶体金检测试纸条说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：猫疱疹病毒 1 型胶体金检测试纸条

商品名称：

英文名称：Colloidal Gold Strips for *Felid alphaherpesvirus 1*

汉语拼音：Maopaozhenbingduyixing Jiaotijin Jianceshizhitiao

【主要成分与含量】

主要成分	含量/规格		
	1 袋/盒	10 袋/盒	20 袋/盒
猫疱疹病毒 1 型胶体金检测试纸条	1 个/袋×1 袋	1 个/袋×10 袋	1 个/袋×20 袋
样品处理液	1.0ml/管×1 管	1.0ml/管×10 管	1.0ml/管×20 管
棉拭子	1 支	10 支	20 支
说明书	1 份	1 份	1 份

【作用与用途】 用于检测病毒细胞培养物及猫鼻拭子和咽拭子样品中的猫疱疹病毒 1 型。

【用法与判定】

1 用法

1.1 待检样品准备

1.1.1 样品采集 将棉拭子在样品处理液中浸湿，插入待检猫鼻腔深部鼻甲黏膜处或口腔深部咽后壁充分旋转涂擦，取出棉拭子。

1.1.2 样品处理

1.1.2.1 病毒细胞培养物样品的处理方法 病毒细胞培养物与样品处理液 1：1 混合，上下颠倒数次，使其与样品处理液混合均匀，待检。

1.1.2.2 鼻拭子、咽拭子样品的处理方法 将采集的拭子插入含有样品处理液的管中，紧靠管内壁旋转多次使样品充分溶解于样品处理液中，待检。


1.2 步骤 将试纸条平放在桌面上，缓慢滴加适量的待检样品（3~4 滴）到加样孔中，加样完成后 15 分钟内观察结果。

2 结果判定

2.1 阳性结果 在试纸条检测线（T 线）和质控线（C 线）处均出现红色条带。

2.2 阴性结果 在试纸条质控线（C 线）处出现一条红色条带。

2.3 无效结果 在质控线（C 线）处未出现红色条带。



试纸条结果判定示意图

【注意事项】

- 1 本品仅供兽医诊断使用，操作应按说明书严格进行。请勿使用过期、损坏的产品，各个组分不能重复使用。
- 2 本品在 10~30℃干燥的环境保存，在室温条件下进行试验。
- 3 试纸条取出后应立即使用，试纸条在空气中暴露时间过长后会受潮失效。
- 4 由于阳性样品的强度不同，检测线可显现出颜色深浅不一致的现象。
- 5 当样品过于黏稠或 T 线显色强度极高导致 C 线显色弱或不显色时，将样品稀释后复检。
- 6 所用样品、废液和废弃物均应进行无害化处理。铝箔袋内干燥剂不可内服。

【规格】 (1) 1 袋/盒 (2) 10 袋/盒 (3) 20 袋/盒

【贮藏与有效期】 10~30℃保存，有效期为 12 个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

(二) 猫疱疹病毒 1 型胶体金检测试纸条内包装标签

兽用

猫疱疹病毒 1 型胶体金检测试纸条

Colloidal Gold Strips for *Felid alphaherpesvirus 1*

20 (10、1) 袋/盒

批准文号：

批 号：

有效期至：

【作用与用途】 用于检测病毒细胞培养物及猫鼻拭子和咽拭子样品中的猫疱疹病毒 1 型。

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 10~30℃保存，有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

猫疱疹病毒 1 型胶体金检测试纸条

1 个/袋

批 号:

有效期至:

【贮藏与有效期】 10~30℃ 保存, 有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

样品处理液

1.0ml/管

批 号:

有效期至:

【贮藏与有效期】 10~30℃ 保存, 有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

十三、猪圆环病毒 2 型、3 型双重荧光 PCR 检测试剂盒说明书和标签

(一) 猪圆环病毒 2 型、3 型双重荧光 PCR 检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称: 猪圆环病毒 2 型、3 型双重荧光 PCR 检测试剂盒

商品名称:

英文名称: Dual Real-time PCR Test Kit for *Porcine circovirus* Type 2 and Type 3

汉语拼音: Zhuyuanhuanbingdu Erxing、Sanxing Shuangchong Yingguang PCR Jianceshijihe

【主要成分与含量】

主要成分	规格与数量
	50 反应/盒
PCV2/3-反应液	925μl×1 管
PCV2/3-酶混合液	50μl×1 管
PCV2/3-阴性对照	100μl×1 管
PCV2/3-阳性对照	100μl×1 管
PCV2/3-内标	50μl×1 管

【作用与用途】 用于检测猪血清、粪便、淋巴结、肺脏和脾脏样品中的猪圆环病毒 2 型和猪圆环病毒 3 型核酸。

【用法与判定】

1 用法

1.1 被检样品的准备

1.1.1 血清样品的采集和处理 用无菌注射器抽取受检猪静脉血不少于 5.0ml，置于无菌离心管内，室温或者 37℃ 倾斜放置自然凝集 20~30 分钟，2000~3000 转/分钟离心 10 分钟，吸取上清液，转入新的离心管中。

1.1.2 粪便样品的采集和处理 取猪新鲜粪便 1.0g，装入 15ml 灭菌离心管中，加入 5.0ml PBS (0.01mol/L, pH 值 7.4)，混匀，3000 转/分钟离心 10 分钟，取上清液，转入新的离心管中。

1.1.3 组织样品的采集和处理 采集受检猪的组织样品（淋巴结、肺脏和脾脏等），装入 15ml 灭菌离心管中。取待检组织样品约 1.0g 剪碎置于灭菌的组织研磨器中充分研磨，加入 PBS (0.01mol/L, pH 值 7.4) 混匀制备 10%组织匀浆液，8000 转/分钟离心 5 分钟，取上清，转入新的离心管中。

1.2 核酸的提取 取处理好的样品，用商品化核酸提取试剂盒提取核酸，作为待检样品应立即检测，若不能及时检测，可在-70℃以下保存 6 个月。

1.3 荧光 PCR

1.3.1 取出试剂盒中的各组分，待其温度平衡至室温后，瞬时离心，备用。

1.3.2 反应体系配制 根据待检样品数量，核算试验所需要的反应数，并按照下表单反应体系配制方法，计算当次试验各组分需要量。反应数=阴性对照数+阳性对照数+样品数+预留数（一般 1~3 个反应）。

单反应体系配制方法

PCV2/3-反应液	18.5μl
PCV2/3-酶混合液	1.0μl
PCV2/3-内标	0.5μl

在适当容积的无菌管中加入上述试剂，混匀后离心，按照 20μl/管分装到 PCR 反应管中。

1.3.3 加样 分别取 5μl 待检样品加入相应反应管中，混匀，瞬时离心后，将反应管放入扩增仪检测孔。

1.3.4 反应程序 按照下表设置反应条件，进行荧光 PCR 扩增。

阶段	条件	循环数
预变性	95℃ 2 分钟	1
变 性	95℃ 15 秒	40
退 火	60℃ 30 秒（此阶段结束时采集荧光信号）	

2 结果判定

2.1 分析条件设定 合理调整阈值线，不同仪器可根据仪器噪音情况进行调整。本试剂盒需配套可同时检测 FAM、HEX/VIC、ROX 标记探针的荧光定量 PCR 仪使用；若仪器不具备对应适配的检测波长，将无法获得准确结果。

2.2 试验成立的条件

2.2.1 PCV2/PCV3-阳性对照 FAM 通道及 ROX 通道 Ct 值均≤35.00；HEX/VIC 通道

Ct 值 $\leq$ 35.00, 均出现典型扩增曲线。

2.2.2 PCV2/PCV3-阴性对照 FAM 通道及 ROX 通道 Ct 值均 $>$ 35.00 或无 Ct 值, 出现或未出现典型扩增曲线; HEX/VIC 通道 Ct 值 $\leq$ 35.00, 出现典型扩增曲线。

2.2.3 被检样品 HEX/VIC 通道 Ct 值 $\leq$ 35.00, 出现典型扩增曲线, 否则本样品检测结果无效。

2.2.4 以上条件需在同一次试验中同时符合, 试验结果有效。

2.3 判定

阳性 若被检样品在相应通道 Ct 值 $\leq$ 35.0, 出现典型扩增曲线, 判为相应病原核酸阳性。FAM 通道表示猪圆环病毒 2 型核酸阳性, ROX 通道表示猪圆环病毒 3 型核酸阳性。

阴性 若被检样品在相应通道 $>$ 35.00 或无 Ct 值, 出现或未出现典型扩增曲线, 判为相应病原核酸阴性。

【注意事项】

1 测试样品时, 应做好生物安全防护。使用不含荧光物质的一次性手套, 并经常替换预防交叉污染。为防止荧光干扰, 应避免用手直接接触, 请勿在 PCR 反应管及管盖上进行标记。

2 实验过程应分区进行(试剂准备区、样品准备区、核酸扩增区), 实验操作的每个阶段使用专用的仪器和设备, 各区各阶段用品不得交叉使用。实验前请仔细阅读本试剂盒说明书, 严格按操作步骤执行。不要使用过期的成分。

3 试剂盒所有组分应在使用前完全融化, 8000 转/分钟离心 15 秒, 使液体全部沉于管底, 吸取液体时移液器吸头尽量在液体表面层吸取, 使用后立即放回 -20°C 以下避光保存。使用时尽量避免反复冻融, 如冻融, 应不超过 3 次。为避免交叉污染, 加核酸模板时应尽量使用带滤芯的一次性吸头, 每次吸液需更换吸头。

4 操作台、移液器、离心机等仪器用品应经常用 1.0%次氯酸钠擦拭消毒。操作过程中移液等过程必须精确。实验房间、超净工作台应定期或每次实验后用紫外灯处理。

【规格】 50 反应/盒

【贮藏与有效期】 -20°C 以下避光保存, 有效期为 12 个月。

【批准文号】

【生产企业】 湖南冠牧生物科技有限公司

仅供兽医诊断使用

(二) 猪圆环病毒 2 型、3 型双重荧光 PCR 检测试剂盒内包装标签

兽用

猪圆环病毒 2 型、3 型双重荧光 PCR 检测试剂盒

50 反应/盒

批准文号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 用于检测猪血清、粪便、淋巴结、肺脏和脾脏样品中的猪圆环病毒 2 型和

猪圆环病毒 3 型核酸。

【贮藏与有效期】 -20℃以下避光保存，有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

PCV2/3-反应液

925μl/管

批 号：

有效期至：

【贮藏与有效期】 -20℃以下避光保存，有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

PCV2/3-酶混合液

50μl/管

批 号：

有效期至：

【贮藏与有效期】 -20℃以下保存，有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

PCV2/3-阴性对照

100μl/管

批 号：

有效期至：

【贮藏与有效期】 -20℃以下保存，有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

PCV2/3-阳性对照

100μl/管

批 号：

有效期至：

【贮藏与有效期】 -20℃以下保存，有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

PCV2/3-内标

50μl/管

批 号：

有效期至：

【贮藏与有效期】 -20℃以下保存，有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

十四、猫泛白细胞减少症病毒胶体金检测试纸条说明书和标签

（一）猫泛白细胞减少症病毒胶体金检测试纸条说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：猫泛白细胞减少症病毒胶体金检测试纸条

商品名称：

英文名称：Colloidal Gold Test Strips of *Feline Panleukopenia Virus*

汉语拼音：Maofanbaixibaojianshaozhengbingdu Jiaotijin Jiance Shizhitiao

【主要成分与含量】

组分名称	规格与数量
	10 头份/盒
猫泛白细胞减少症病毒胶体金检测试纸条	1 头份/袋，10 头份/盒
样品处理液	500 μ l/支，10 支/盒
塑料吸头	10 个/袋，1 袋/盒
拭子	1 支/袋，10 支/盒
说明书	1 份/盒

【作用与用途】 用于检测猫粪便、肛拭子和病毒培养物等样品中的猫泛白细胞减少症病毒。

【用法与判定】

1 用法

- 1.1 用样品采集拭子采集样品。
- 1.2 将样品放入含有样品处理液的容器中。
- 1.3 用拭子充分搅拌溶液，以便从样品中彻底提取病毒。
- 1.4 将管子竖直放置，直到大颗粒落下（20 秒）。
- 1.5 将抗原检测试纸条放置在平面。
- 1.6 用塑料吸头吸取样品溶液的上清液，然后向试验装置中滴入 3 滴。
- 1.7 在 5~15 分钟内判定结果。

2 判定

2.1 试验成立条件 试纸条质控线（C 线）处应出现红色条带，否则，该试验不成立。

2.2 判定 若试纸条检测线（T 线）处出现红色条带，判为阳性，即有猫泛白细胞减少症病毒，否则判为阴性。检测线（T 线）区内的有色条带可出现颜色深浅的现象，在规定的观察时间内，不论颜色深浅（即使只有非常弱的红色条带）均判为阳性。

【注意事项】

- 1 本试纸为一次性检测使用。本试纸仅用于兽医诊断使用，操作应严格按照说明书进

行。

- 2 本试纸用于定性的筛选检查，不能确定猫泛白细胞减少症病毒在样品中的含量。
- 3 本试剂在 2~30℃干燥的环境中保存，检测过程在室温下进行。
- 4 请勿使用过期的或包装袋破损的试纸条。
- 5 为保证试纸条的层析效果，本品应在平整台面上使用。
- 6 试纸条取出后应立即使用，在空气中暴露时间过长后会失效。
- 7 冷冻可损坏试纸条检测区，请勿在使用及保存过程中冷冻试纸条。
- 8 试纸条用过应放回包装袋中，集中消毒处理，以防污染环境。

【规格】 10 头份/盒

【贮藏与有效期】 2~30℃避光干燥保存，有效期为 24 个月。

【批准文号】

【生产企业】 广州源博医药科技有限公司

仅供兽医诊断使用

(二) 猫泛白细胞减少症病毒胶体金检测试纸条内包装标签

兽用

猫泛白细胞减少症病毒胶体金检测试纸条

10 头份/盒

批准文号：

批 号：

有效期至：

【作用与用途】 用于检测猫粪便、肛拭子和病毒培养物等样品中的猫泛白细胞减少症病毒。

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~30℃避光干燥保存，有效期为24个月。

【生产企业】 广州源博医药科技有限公司

仅供兽医诊断使用

兽用

猫泛白细胞减少症病毒胶体金检测试纸条

1 头份/袋

批 号：

有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~30℃避光干燥保存，有效期为24个月。

【生产企业】 广州源博医药科技有限公司

仅供兽医诊断使用

兽用

样品处理液

0.5ml/支

批 号：

有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~30℃避光干燥保存，有效期为24个月。

【生产企业】 广州源博医药科技有限公司

仅供兽医诊断使用